Nagarjuna Suraksha GR

Chlorantraniliprole 0.4% w/w GR
Insecticide

Chlorantraniliprole 0.4% w/w GR is a novel granular insecticide which contains 0.4% Chlorantraniliprole active ingredient.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gms)	Formulation (kgs)			
Paddy	Yellow Stem Borer (Scirpophaga incertulas) Paddy leaf Folder (Cnaphalocrosis medinalis)	40	10		53	
Sugarcane	Early Shoot Borer (Chilo infuscatellus) Top Borer (Scirphophaga excerptalis).	75	18.75		147	

Direction Of Use: Uniformly broadcast Chlorantraniliprole granules @ 4 kg/ acre in Rice and 7.5 kg/ acre in Sugarcane. For Sugarcane, application is to be done in furrows at planting or at the base of young emerging shoots along the furrows followed by an irrigation.

Time of Application: 1. 15-35 DAT (Days after transplanting) for Rice. 2. In case of sugarcane, application between planting to 1st irrigation is recommended for Early Shoot Borer while for Top borer application should coincide with appearance of Top borer moths.

Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal's feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin and inhalation of the insecticide. 3.Wash thoroughly the contaminated clothes and body parts after handling. 4. Wear full protective clothing viz., rubber gloves, goggles. eye/face shield while handling.

Symptoms Of Poisoning: Lethargy, nasal secretion and blurred vision.

First Aid: 1. If on skin, wash the contaminated skin with soap and water. 2. If on eyes, flushing with plenty of water is plenty of water is advisable. Consult a physician if necessary. 3. If inhaled, no specific intervention is indicated. 4. If swallowed, Consult a physician.

Phytotoxicity: No phytotoxic at recommended stages.
Antidote: No specific antidote is available, treat symptomatically.

Disposal Of Used Container: 1. The packages shall be broken and buried ½meter deep in soil away from habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages by surplus material and wrapping shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions: 1. The packages containing the insecticide shall be stored in original containers in separate rooms or premises, away from the room or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. Don't store or consume food, drink or tobacco in areas where they become contaminated with this material. 3. The room and premises meant for storing the insecticides shall be well built, cool dry place, well-lit and ventilated and of sufficient dimension.

Chemical Composition:

Chlorantraniliprole a.i.	0.40 % w/w
Polyacrylic acid	0.40 % w/w
Water	0.40 % w/w
Dodecyl hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl) phosphate	0.40 % w/w
Calcium lignosulphonate	1.00 % w/w
Dye blue	0.05 % w/w
Talc powder	8.00 % w/w
Sand	Q.S % w/w
Total	100 % w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this label/ leaflet

Manufactured & Marketed by : NACL Industries Limited
Regd.Off.: Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India. **Factory :** Ethakota-533 238, Dr. B. R. Ambedkar Konaseema Dist., A.P.

नागार्जुना सुरक्षा जी आर

क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल 0.4% भार / भार जी आर
कीटनाशक

क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल 0.4% भार / भार जी आर एक नवीन ग्रैन्यूल कीटनाशी है जिसमें 0.4% क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल सक्रिय तत्व के रूप में मिश्रित है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिडकान तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिडकाव के बाद (घंटे)
		स.तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली.)			
धान	पीत तना छेदक (स्र्किपोफागा इर्न्सेटुलस), धान का पत्ता मोड़क(नैफालाक्रोसिस मेडिनेलिस)	40	10		53	
गन्ना	तना / कॉपल छेदक (काइलो इनफसकैटेलस), शीर्ष छेदक (स्र्किपोफागा एक्सरप्टेलिस)	75	18.75		147	

उपयोग केलिए दिशा-निर्देश: क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल ग्रेन्यूल्स 4 कि.ग्रा प्रति एकड़ धान के खेत में और 7.5 कि.ग्रा प्रति एकड़ गन्ने के खेत में एक साथ बिखरे। गन्ने में फरटेरा का प्रयोग बुआई के समय नाली में तथा अंकुरण के समय कल्लों की जड़ो के पास मिट्टी में पंक्ति में डाले और इसके बाद सिंचाई कर दें।
प्रयोग का समय: 1. धान की रोपाई के 15-35 दिन बाद बिखराव करें। 2. गन्ने के खेत में बुआई से पहली सिंचाई तक प्रयोग करने पर तना छेदक से बचाव होता है। शीर्ष छेदक से बचने के लिए शीर्ष छेदक कीटों के अण्डज दिखते ही प्रयोग करें।
प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: 1. खाधसामग्री, खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। 2. मुह, त्वचा, आंखों और साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। 3. प्रयोग करने के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। 4. प्रयोग करते समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 5. प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे जैसे रबड़ के दस्ताने, चश्मे और आँखध्चहरे का नकाब पहनें।
विष के लक्षण: आलस आनाए धूंधला दिखना तथा नाक बहना।
प्राथमिक चिकित्सा: 1. त्वचा संपर्क पर, त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। 2. आँख से संपर्क होने पर, आंखो को खूब सारे पानी से प्रक्षालन करने की सलाह दी जाती है। यदि जरूरी लगे तो चिकित्सक से संपर्क करें। 3. सांस में जाने पर, कोई विशिष्ट उपचार नही बताया गया है। 4. निगलने पर चिकित्सक से संपर्क करें।
पौधविशाक्तता: सिफारिश स्तर में छिड़कने पर पौध विषाक्तता नहीं होती।
विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नही हैए लक्षण के अनुसार इलाज करें।
खाली डिब्बों का निपटारा: 1. खाली डिब्बों को तोड कर जमीन में 1/ 2 मीटर गहराई में निवार स्थान से दूर मिट्टी में गाड दें। 2. खाली डिब्बों को दुबारा काम में लेना रोकने के लिए बाहर न छोडें। 3. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि पैकेज / मशीन की धुलाई बची हुई साम्रगी आदि की नि कासी की व्यवस्था ऐसी सुरक्षित से करना चाहिएए ताकि इनसे पानी, वातावरण व चारे दुषित न हो, खाली डिब्बों और पैकेज को तोडकर अबादी से दूर गाढ देना चाहि ए।
संग्रहण की शर्तें: 1. कीटनाशक के पैकटो को अलग-अलग कमरों या जगहों में अन्य वस्तुएं खाध पदार्थो भंडारण किये जाने वाले कमरों या जगहो से दूर कीटनाशक के प्रकार व परिणाम के अनुसार ताला चाबी में बंद करके रखा जाना चाहि ए। 2. जहाँ भोजन, पेयजल, तंबाकू आदि संदूषित हो जाए, वैसी जगह पर इस साम्रगी को स्टोर न करे और न ही वहां खाये पीयें। 3. जिस कमरे अथवा जगह में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाश युक्त, हवादार व आयतन में पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहि एं।

रासायनिक संरचना:

क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल	0.40 % भार/भार
पोलिएक्रिलिक ऐसिड	0.40 % भार/भार
पानी	0.40 % भार/भार
डोडिसिल हाइडो्क्सीपोलि(ओक्सी -1,2-इथेनडाइल) फास्फेट	0.40 % भार/भार
कैलशियम इग्नोसल्फोनेट	1.00 % भार/भार
डाइ ब्लू	0.05 % भार/भार
टाल्क पाउडर	8.00 % भार/भार
बालू	पर्याप्त मात्रा
कुल	100.00 % भार/भार

सावधानी : इस लेबल / पत्रक पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करे।

उत्पादक और विक्रेता द्वारा : **ऐन.ऐ.सी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
प्लाट नं. १२-ए, सी ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स,नागार्जुना हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद-५०० ०८२, तेलंगाणा, भारत **कर्मागार:** ईतकोटा-५३३ २३८, डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा जिल्ला, आंध्रप्रदेश.

नागार्जुन सुरक्षा जीआर

क्लोरानट्रानीलिप्रोल ०.४% भार/भार जीआर
(किटकनाशक)

क्लोरानट्रानिलिप्रोल ०.४% व/व जीआर हे एक नवीन दाणेदार कीटकनाशक आहे ज्यामध्ये ०.४% क्लोरानट्रानिलिप्रोल सक्रिय घटक आहे.

शिफारस:

पिक(के)	किडीचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर		पाण्यातील द्रावण (लिटर्स)	अंतिम फवारणी ते कापणी दरम्यान प्रतीक्षा कालावधी (दवस)	प्रत्येक फवारणीनंतर पुनःप्रवेश (तासांमध्ये)
		स.त. (ग्राम)	मिश्रण (मिली)			
भात	पिवळा खोडकिडा (स्किफोफागा इनसरच्युअल्स) भात पाने गुंडाळणारी अळी (नॅफालोक्रोसिस मेडीनेलिस)	40	10		53	
ऊस	शेंडा पोखरणारी अळी (चिलो इन्फुसक्टॅलस) शेंडा पोखरणारी अळी (स्किर्पोफेज एक्सरप्टॅलिस)	75	18.75		147	

वापरासाठी निर्देश: क्लोरानट्रानिलिप्रोल दाणे ४ किलो/ एकर भातामध्ये आणि ७.५ किलो/ एकर उसामध्ये एकसमान प्रसारित करा. ऊसासाठी, लागवडीच्या वेळी किंवा उगवत्या कोंबांच्या पायथ्याशी ओळींमध्ये द्यावे लागते आणि त्यानंतर सिंचन केले जाते.
वापरण्याची वेळ: १. भातासाठी १५-३५ डीएटी (लावणीनंतरचे दिवस). २. उसाच्या बाबतीत, लागवडीपासून ते १ ल्या सिंचनादरम्यान शेंडे अळीसाठी याची शिफारस केली जाते, तर शूट बोअररसाठी, टॉप बोअरर पतंगाच्या दिसण्याच्या वेळी फवारणी करावी.
खबरदारी: १. अन्नपदार्थ, रिकामे अन्नपदार्थांचे डबे आणि पशुखाद्यापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा आणि कीटकनाशक हुंगणे टाळा. ३. प्रदूषित कपडे आणि शरीराचे भाग फवारणीनंतर स्वच्छ धुवा. ४. हाताळताना पूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घाला उदा., रबरी हातमोजे, गॉगल, डोळा/मुखवटा.
विषबाधेची लक्षणे: सुस्ती, अनुनासिक स्राव आणि अंधुक दृष्टी.
प्रथमोपचार: १. त्वचेवर असल्यास, दूषित त्वचा साबणाने आणि पाण्याने धुवा. २. डोळ्यांवर आल्यास, भरपूर पाण्याने धुवावे. आवश्यक असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. ३. हुंगल्यास, कोणताही विशिष्ट हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. ४. गिळल्यास, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
वनस्पतींसाठी विषकारकता: शिफारस केलेल्या मात्रेत वापरल्यास वनस्पतींसाठी विषकारक नाही.
प्रति उपाय: कोणताही विशिष्ट प्रतिउपाय ज्ञात नाही. लक्षणांनुसार उपचार करावेत.
वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: १. पाकिटे तोडून वस्तीपासून दूर जमिनीत अर्धा मीटर खोल गाडावी. २. वापरलेली पाकिटे उघड्यावर टाकू नयेत म्हणजे त्यांचा पुनर्वापर होणार नाही. ३. पर्यावरण आणि जल प्रदूषण रोखण्यासाठी अतिरिक्त सामग्री आणि गुंडाळलेल्या पॅकेजेसची सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावावी.
साठवणीच्या अटी: १. किटकनाशक असलेली पाकिटे स्वतंत्र खोल्या किंवा इमारतींमध्ये अन्य वस्तू विशेषतः अन्नपदार्थ असलेल्या खोल्या किंवा इमारतींपासून दूर साठवावीत किंवा किटकनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरुप यांच्यानुसार स्वतंत्र कपाटांमध्ये कुलूपबंद अवस्थेत ठेवावीत. २. या औषधाने प्रदूषित होऊ शकतील अशा ठिकाणी अन्नपदार्थ, पेय किंवा तंबाकू साठवू किंवा सेवन करु नका. ३. किटकनाशक साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या चांगल्या बांधलेल्या, प्रकाशमय आणि हवेशीर आणि पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात.

रासायनिक संरचना:

क्लोरानट्रानिलिप्रोल स.त.	0.40% व/व
पॉलीअ‍ॅक्रिलिक ऍसिड	0.40% व/व
पाणी	0.40% व/व
डोडेसील हायड्रोक्सीपॉली (ऑक्सि-1,2-इथेनेडियल) फॉस्फेट	0.40% व/व
कॅल्शियम लिग्नोसल्फोनेट	1.00% व/व
निळा रंगवा (डाई ब्लू)	0.05% व/व
टॅल्क पावडर	8.00% व/व
वाळू	क्यू.एस % व/व
एकूण :	100% व/व

इशारा: हे लेबल/पुस्तिकेत नमूद केल्याखेरीज अन्य पिकांवर याचा वापर क

उत्पादक और विक्रेता द्वारा: **ऐन.ऐ.सी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
प्लाट नं. १२-ए, सी ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स,नागार्जुना हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद-५०० ०८२, तेलंगाणा, भारत **कर्मागार:** ईतकोटा-५३३ २३८, डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा जिल्ला, आंध्रप्रदेश.

ਨਾਗਾਰਜੁਨਾ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਜੀਆਰ

ਕਲੋਰਾਨਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪਰੋਲ 0.4% ਭਾ/ਭਾ ਜੀਆਰ
(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਕਲੋਰਾਨਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪਰੋਲ 0.4% ਭਾ/ਭਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਾਣੇਦਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0.4% ਕਲੋਰਾਨਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪਰੋਲ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼:

ਫ਼ਸਲਾਂ	ਕੀਟ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਨਾਂਅ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕ		ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀਟਰ)	ਅੰਤਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)	ਹਰੇਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ-ਦਾਖ਼ਲਾ (ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ)
		ਏਆਈ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਮਿਲੀ)			
ਝੋਨਾ	ਪੀਲਾ ਤਨਾ ਛੇਦਕ (ਸਿਰਪੋਫਾਗਾ ਇਨਸਰਟੁਲਾਸ) ਝੋਨਾ ਪੱਤਾ ਫੋਲਡਰ (ਕਨੇਫਾਲੋਕ੍ਰੋਸਿਸ ਮੇਡੀਨਾਲਿਸ)	40	10		53	
ਗੰਨਾ	ਅਗੇਤਾ ਟਹਿਣੀ ਛੇਦਕ (ਕਿਲੋਇਨਫਸਕਾਟੇਲੱਸ) ਟੱਪ ਬੋਰਰ (ਸਿਰਫੋਫਾਗਾ ਐਕਸਰਪਟਾਲਿਸ)	75	18.75		147	

ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ : ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿ ਗ੍ਰਾ/ਏਕੜ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਕਿ ਗ੍ਰਾ/ਏਕੜ ਕਲੋਰਾਨਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪਰੋਲ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਪਸਾਰ ਕਰੋ। ਗੰਨੇ ਲਈ, ਰੁਪਾਈ ਸਮੇਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ : 1. ਚੌਲਾਂ ਲਈ 15-35 ਡੀਏਟੀ (ਰੁਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ) 2. ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਗੇਤੇ ਟਹਿਣੀ ਛੇਦਕ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਦਕਿ ਸਿਰਾ ਛੇਦਕ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਾ ਛੇਦਕ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹਤਿਆਤ : 1. ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। 2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। 3. ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। 4. ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਧੁੱਪ ਦੀ ਐਨਕ, ਅੱਖਾਂ/ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਵਰਗੇ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੱਛਣ : ਆਲਸ, ਨੱਕ ਵਹਿਣਾ ਅਤੇ ਧੁੰਧਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ।

ਮੁਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ : 1. ਜੇਕਰ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। 2. ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। 3. ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਖਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4. ਜੇਕਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਪੌਦਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ (ਫਾਇਟੋਟੱਕਸੀਸਿਟੀ) : ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਨਹੀਂ।
ਇਲਾਜ : ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ : 1. ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ 1/2 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2. ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਿਦਾ। 3. ਪੈਕੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰੈਪਿੰਗ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੁਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ : 1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅਤੇ ਤਾਸੀਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2. ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ, ਪੀਣ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 3. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਕੇ, ਚੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ:

ਕਲੋਰਾਨਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪਰੋਲ ਏ.ਆਈ.	0.40% ਭਾ/ਭਾ
ਪੋਲੀਅਕ੍ਰਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ	0.40% ਭਾ/ਭਾ
ਪਾਣੀ	0.40% ਭਾ/ਭਾ
ਡੋਡੇਸਾਇਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਪੋਲੀ (ਆੱਕਸੀ-1, 2 -ਈਥਾਨੇਡਾਇਲ)	0.40% ਭਾ/ਭਾ
ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ ਲਿਗਨੋਸਲਫੋਨੇਟ	1.00% ਭਾ/ਭਾ
ਡਾਇ ਬਲੂ	0.05% ਭਾ/ਭਾ
ਟੈਲਕ ਪਾਉਡਰ	8.00% ਭਾ/ਭਾ
ਰੇਤ	ਕਿਉ.ਐਸ% ਭਾ/ਭਾ
ਕੁੱਲ:	100% ਭਾ/ਭਾ

ਸਾਵਧਾਨੀ : ਇਸ ਲੇਬਲ/ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ : **ਐਨ ਏ ਸੀ ਐਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ**
ਪਲੱਟ ਨੰ. 12 -ਏ, ''ਸੀ'' ਬਲੱਕ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਟਾਵਰਸ, ਨਾਗਾਰਜੁਨਾ ਹਿੱਲਸ, ਪੰਜਾਗੁੱਟਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ 500 082,
ਫੈਕਟਰੀ: ਏਥਾਕੋਟਾ-533238, ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੋਨਾਸੀਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਏ.ਪੀ.

નાગાર્જુના સુરક્ષા જીઆર

ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 0.4% ભાર/ભાર જી.આર.
(જંતુનાશક)

ક્લોરાન્થ્રાનિલિપ્રોલ 0.4% ભાર/ભાર જી.આર. એ આદર્શ દાણાદાર કીટનાશક છે જેમાં 0.4% ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ સક્રિય ઘટક છે.

ભલામણઃ

પાક(કો)	કીટકનું સામાન્ય નામ	ડોઝેજ/હેક્ટર		પાણીમાં પાતળું કરવું (લિટર)	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી વચ્ચેનો પ્રતિક્ષાગાળો (દિવસમાં)	દરેક વપરાશ બાદ પુનઃપ્રવેશ (કલાકમાં)
		એ.આઈ. (ગ્રામ)	સંયોજન (મિલી)			
ડાંગર	યલો સ્ટેમ બોરર (સ્કિર્પોફિગા ઈન્સર્ટ્યુલાસ) ડાંગર લીફ ફોલ્ડર (કિનાફાલોક્રોસિસ મેડિનાલિસ)	40	10		53	
શેરડી	અર્લી શૂટ બોરર (ચિલો ઈનફુસ્કાટેલસ) ટોપ બોરર (સ્કીરોપોફેજ એક્સેર્ટપ્ટાલિસ)	75	18.75		147	

ઉપયોગના નિર્દેશઃ એકસમાન રીતે ક્લોરાન્ટરાનિપ્રોલ દાણા 4 કિગ્રા/ એકરના દરે ચોખાના અને 7.5 કિગ્રા/એકરના દરે શેરડીના ખેતરમાં છંટકાવ કરવો. શેરડી માટે, રોપણી વખતે ઉપયોગ ચાસમાં કરવો અથવા તો અંકુરણ ફૂટે ત્યારે ચાસમાં કરીને પછી સિંચાઈ કરવી.
છંટકાવનો સમયઃ 1. 15-35 ડીએટી (પ્રત્યારોપણ કર્યા પછી દિવસો) ડાંગર 2. શેરડીના સંજોગોમાં, અર્લી શૂટ બોરરના નિયંત્રણ માટે રોપણીથી 1લી સિંચાઈ વચ્ચે, જ્યારે ટોપ બોરરના નિયંત્રણ માટે ટોપ બોરર મોઠ દેખાય ત્યારે જ ઉપયોગની ભલામણ કરાય છે.
સાવચેતીઓઃ 1. ખાદ્યપદાર્થો, ખાદ્યપદાર્થોનો સંગ્રહ કરવાના ડબ્બા અને પ્રાણીઓના ખોરાકથી તેને દૂર રાખવું. 2. મોઢા, આંખો અને ત્વચા સાથેનો સંપર્ક ટાળો અને કીટનાશક શ્વાસમાં ન જાય તેનું ધ્યાન રાખો. 3. છંટકાવ કર્યા બાદ ઝેરીઅસરવાળા કપડાં અને શરીરના ભાગોને બરાબર સાફ કરી દેવો. 4. સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક વસ્ત્રો એટલે કે રબરના ગ્લોવ્ઝ, ગોગલ્સ પહેરવા. સંચાલન વેલાએ આંખ/ચહેરાને ઢાંકવો.
ઝેરીઅસરના ચિહ્નોઃ થાક, નાક વહેવું અને ધૂંધળુ દેખાવું.
પ્રાથમિક ઉપચારઃ 1. ત્વચાના સંપર્કમાં આવે તો ત્વચાને પાણી અને સાબુ વડે ધોઈ નાંખવી. 2. આંખોમાં જાય, તો પૂષ્કળ માત્રામાં પાણી વડે છાલક મારવી સલાહભરી છે. જરૂર પડ્યે તબીબનો સંપર્ક કરવો. 3. શ્વાસમાં જતું રહે, તો કોઈ ચોક્કસ હસ્તક્ષેપ સૂચવાયો નથી. 4. જો ગળી ગયા હોવ તો, ફિઝિશિયનની સલાહ લો.
ફાયટોટોક્સિટીઃ ભલામણ કરેલા તબક્કે કોઈ ફાયટોટોક્સિક નથી.
વિષનાશકઃ કોઈ એન્ટિડોટ જાણીતો નથી. ચિહ્નો અનુસાર ઉપચાર કરવો.
ઉપયોગમાં લીધેલાં ડબ્બાંઓનો નિકાલઃ 1. પેકેજીસને માનવ વસાહતથી દૂર તોડીને જમીનમાં ટ મીટર ઊંડો ખાડો કરીને તેમાં દાટી દેવું. 2. ઉપયોગમાં લીધેલાં પેકેટોનો ફરીથી ઉપયોગ ન થાય તે માટે તેને ખુલ્લામાં ત્યજી દેવા જોઈએ નહીં. 3. ઉપયોગમાં લીધેલા પેકેટો, વધારાની સામગ્રી અને મશીનમાંથી નીકળેલા ધોવાણનો નિકાલ સલામત રીતે કરવો જોઈએ, જેથી પર્યાવરણ અને પાણી પ્રદૂષિત ન થાય.
સંગ્રહ કરવાની પરિસ્થિતિઓઃ- 1. પેકેજીસ કે જેમાં આ સામગ્રી હોય તેને અલગ ઓરડામાં અથવા તો અન્ય સામગ્રીનો સંગ્રહ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઓરડા કે સંકુલથી દૂર સંગ્રહિત કરાવું જોઈએ અથવા તો સામગ્રીના પ્રકાર અને જથ્થાના આધારે તેને અલગ અલ્મારીમાં તાળા અને ચાવી હેઠળ રાખવી જોઈએ. 2. આ સામગ્રી સાથે ઝેરીઅસર ન થાય તે માટે તેને ખાદ્યપદાર્થ, પીણાં કે તમાકુની સાથે સંગ્રહિત ન કરવું. 3. જંતુનાશકનો સંગ્રહ કરવા માટેનો ઓરડો સારી રીતે બંધાયેલો, ઠંડો, શુષ્ક, સારા હવાઉજાસ ધરાવતો અને બાષ્પને કારણે દુષિત થવાનું ટાળવા પૂરતો મોટો હોવો જોઈએ.

રાસાયણિક સંરચનાઃ

ક્લોરાન્ટ્રિએનિલિપ્રોલ (એ.આઈ.)	0.40% ભાર/ભાર
પોલિએક્રેલિક એસિડ	0.40% ભાર/ભાર
પાણીઃ	0.40% ભાર/ભાર
ડોડેકલ હાઇડ્રોક્સીપોલી (ઑક્સી-1,2-ઇથાનેડીલ) ફોસ્ફેટ	0.40% ભાર/ભાર
કેલ્શિયમ લિગ્નોસલ્ફોનેટ	1.00% ભાર/ભાર
ડાઈ બ્લુ	0.05% ભાર/ભાર
ટેલકમ પાઉડરી	8.00% ભાર/ભાર
રેતી	ક્યૂ.એસ. % ભાર/ભાર
કુલ	100% ભાર/ભાર

ચેતવણીઃ આ લેબલ/લીફલેટમાં દર્શાવવામાં આવેલા પાક સિવાયના અન્ય કોઈ પાક પર ઉપયોગ કરવો નહીં.

નિર્માતા અને વેચાણવ્યવસ્થા દ્વારાઃ **એન.એ.સી.એલ. ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ**
પ્લૉટ નં. 12-એ, ''સી'' બ્લૉક, લક્ષ્મી ટાવર્સ, નાગાર્જુના હિલ્સ, પંજાગુટ્ટા, હૈદરાબાદ- 500 082 તેલંગાણા, ભારત **ફેક્ટરીઃ** એથાકોટા-533238, ડૉ. બી. આર. આંબેડકર કોનાસીમા જલ્લિો., એ.પી.

நாகார்ஜுனா சுரக்ஷா ஜி.ஆர்

க்ளோரன் ட்ரேனிலிப்ரோல் 0.4% ஏ/ஏ ஜி.ஆர் (பூச்சிக்கொல்லி)

க்ளோரன்ட்ரானிலிப்ரோல் 0.4% ஏ/ஏ ஜி.ஆர் ஒரு நூதன துகள் வடிவ பூச்சிக்கொல்லியாகும். இது ஒரு 0.4% க்ளோரன்ட்ரானிலிப்ரோல் ஆக்டிவ் ஆக்கக்கூறாகும்.

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	அளவு /ஹெக்டேர்		தண்ணீரில் செறிவு குறைத்தல் (லிட்டர்)	கடைசி ஸ்ப்ரேயிலிருந்து அறுவடை வரைக்குமான காத்திருப்பு காலம் (நாட்களில்)	ஒவ்வொரு உபயோகிப்புக்கு பிறகும் மறு - நுழைவு (மணிகளில்)
		AI (கிராம்)	ஃபார்முலேஷன் (மிலி)			
நெல்	மஞ்சள் தண்டு துளைப்பான் (ஸ்கிர்போபாகா இன்சர்டுலாஸ்) நெல் இலை சுருட்டுப்புழு (க்னாபலோக்ராசிஸ் மெடினலிஸ்)	40	10		53	
கரும்பு	ஆரம்ப தண்டு துளைப்பான் (சிலோஇன்ஃபுஸ்கேடெலஸ்) மேல் துளைப்பான் (ஸ்கிர்ஃபோஃபாகா எக்ஸர்ப்டாலிஸ்)	75	18.75		147	

உபயோகிப்பதற்கான வழிகாட்டு நெறிகள்: சீராக தூவவும் க்ளோரன்ட்ரானிலிப்ரோல் துகள்களை அரிசியில் ஏக்கருக்கு 4 கிலோ வீதமும், கரும்பில் ஏக்கருக்கு 7.5 கிலோ வீதமும் சீராக தூவவும். கரும்புக்கென, நடவு செய்யும் இடத்திலோ அல்லது வளர்ந்து வரும் தளிர்களின் அடிப்பகுதியிலோ பூச்சிக்கொல்லியை இட வேண்டும்.

உபயோகிக்கும் காலம்: 1. அரிசிக்கென 15-35 DAT (மாற்றி நடப்பட்ட நாட்களுக்குப் பிறகு) 2. கரும்பாக இருந்தால், ஆரம்பத் துளிர்களுக்கென நடப்பட்டதிலிருந்து முதல் நீர்ப்பாய்ச்சலுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் உபயோகிப்பது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. மேல் துளைப்பான் புழுக்கள் தென்பட்டதுமே மேல் துளைப்பான் பூச்சி மருந்து தெளிக்கப்பட வேண்டும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. உணவுப் பொருட்கள், காலி உணவுப் பொருள் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குத் தீவனங்களிலிருந்து தூரமாக வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் சருமத்தில் படுவதை தவிர்க்கவும் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லியை முகர்வதையும் தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரே செய்த பின்னர், மாசடைந்த துணிகள் மற்றும் உடல் பாகங்களை நன்றாக கழுவவும். 4. பூச்சிக்கொல்லியை உபயோகிக்கும் போது, ரப்பர் கையுறைகள், குளிர் கண்ணாடிகள், கண்கள் / முகமூடி போன்ற முழு பாதுகாப்பு உடைகளை அணியவும்.

நச்சு அறிகுறிகள்: சோம்பல், நாசி சுரப்பு மற்றும் மங்கலான பார்வை.

முதலுதவி: 1. சருமத்தில் பட்டிருந்தால், கறைபட்ட சருமத்தை சோப் மற்றும் தண்ணீரால் கழுவவும். 2. கண்களில் பட்டால், நிறைய தண்ணீர் விட்டு நன்றாக கழுவுவது அறிவிறுத்தப்படுகிறது. தேவைப்பட்டால் ஒரு மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும். 3. முகர்ந்திருந்தால், குறிப்பிட்ட குறுக்கீடு எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. 4. விழுங்கியிருந்தால், மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கவும்.

தாவர நச்சு: பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவுகளில், தாவர நச்சு கொண்டதல்ல.

விஷமுறிவு: குறிப்பிட்ட விஷமுறிவு எதுவும் கிடையாது. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சையளிக்கவும்.

உபயோகிக்கப்பட்ட கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்துதல்: 1. பேக்கேஜுகளை உடைத்து, மனித நடமாட்டமுள்ள இடத்திலிருந்து தூரமாக, மண்ணில் 1/2 மீட்டர் ஆழத்தில் புதைக்கவும். 2. உபயோகித்த பேக்கேஜுகள் மீண்டும் உபயோகிக்கப்படுவதை தவிர்க்க, அவற்றை வெளியே விட்டு வைக்கக் கூடாது. 3. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தண்ணீர் மாசை கட்டுப்படுத்த, அதிகப்படி ஸ்ப்ரே பொருட்கள், கருவிகள் மற்றும் கொள்கலன்களை கழுவிய நீரை, பாதுகாப்பான முறையில், அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.

சேமிப்பு நிலைமை: 1. பூச்சிக்கொல்லிகளை கொண்டுள்ள பேக்கேஜுகள், பிற பொருட்களை வைத்திருக்கும் அறைகளிலிருந்து தூரமாக தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது பூச்சிக்கொல்லிகளின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டிய தனி அலமாரிகளில் சேமிக்கப்பட வேண்டும். 2. இந்த களைக்கொல்லி பட்டு, மாசு உண்டாகாமல் இருக்க, உணவு மற்றும் புகையிலையை உண்ணவோ, குடிக்கவோ அல்லது சேமிக்கவோ கூடாது. 3. பூச்சிக்கொல்லிகளை சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள், நன்கு கட்டப்பட்டு, உலர்ந்து, நல்ல வெளிச்சத்துடன், காற்றோட்டமாக இருப்பதுடன், போதிய அளவுகளுடனும் இருக்க வேண்டும்.

இரசாயன கலவை :

க்ளோரன் ட்ரேனிலிப்ரோல் (a.i.)	0.40% ஏ/ஏ
பாலியாக்ரைலிக் அமிலம்	0.40% ஏ/ஏ
தண்ணீர்	0.40% ஏ/ஏ
டோட்சைல் ஹைட்ராக்ஸிபாலி (ஆக்ஸி-1,2-எதனெடியில்) பாஸ்பேட்	0.40% ஏ/ஏ
கால்ஷியம் லிக்னோசல்ஃபோனேட்	1.00% ஏ/ஏ
டை ப்ளூ	0.05% ஏ/ஏ
டால்க் னள்	8.00% ஏ/ஏ
மணல்	Q.S % ஏ/ஏ
மொத்தம்:	100% ஏ/ஏ

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள் / சிற்றேட்டில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களை விடுத்து, வேறு எதன் மீதும் உபயோகிக்கக் கூடாது.

தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் சந்தைப்படுத்துபவர்கள் : என்ஏசிஎல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்
பிளாட் எண் 12-அ, "இ"-பிளாக், லக்ஷமி டவர்ஸ், நாகார்ஜுனா ஹில்ஸ், புஞ்சகுட்டா, ஹைதிராபாத் - 500 082, தெலுங்கானா, இந்தியா
ஆந்திரப் பிரதேசம், இந்தியா. ஃபேக்டரி : எதாகோட்டா - 533 238,
டாக்டர். பி. ஆர். அம்பதேக்கர் கோனீமா மாவட்டம் ஆந்திரப் பிரதேசம், இந்தியா.

ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸುರಕ್ಷಾ ಜಿಆರ್

ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 0.4% ತೂ/ತೂ ಜಿಆರ್ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಕ್ಲೋರಂಟಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 0.4% ತೂ/ತೂ ಜಿಆರ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 0.4% ಕ್ಲೋರಂಟಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು:

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀಟರ್)	ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ ಫಸಲು ಕೊಯ್ಯುವಿಕೆ ನಡುವೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರತಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಬಳಿಕ ಮರು-ಪ್ರವೇಶ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)
		ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಮಿಲೀ)			
ಭತ್ತ	ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು (ಸ್ಕಿರ್ಪೋಫಾಗ ಇನ್ಸರ್ಟುಲಾಸ್) ಭತ್ತ ಎಲೆ ಮಡಚುವ ರೋಗ (ಕ್ನಾಫಲೋಕ್ರೊಸಿಸ್ ಮೆಡಿನಾಲಿಸ್)	40	10		53	
ಕಬ್ಬು	ಬೇಗನೇ ಕಾಣುವ ಶೂಟ್ ಬೋರರ್ (ಚಿಲೋಯಿನ್ಫುಸ್ಕಾಟೆಲ್ಲಸ್) ಸುಳಿಕೊರಕಹುಳು (ಸ್ಕಿರ್ಪೋಫಾಗ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಟಾಲಿಸ್)	75	18.75		147	

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ @ 4 ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 7.5 ಕೆಜಿಯನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಕ್ಲೋರಂಟಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು, ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಎಳೆಯ ಚಿಗುರುಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಮಯ: 1. ಭತ್ತದಲ್ಲಿ 15–35 ಡಿಎಟಿ (ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ದಿನಗಳು). 2. ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚಿಗುರು ಕೊರಕಕ್ಕೆ ನಾಟಿಯ ನಂತರ ಮೊದಲ ನೀರಾವರಿಯ ನಡುವಿನ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರೆ ತುದಿ ಕೊರಕಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುವ ಪತಂಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು–ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕದ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ಸಿಂಪಡಣೆಯ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 4. ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಅಂದರೆ., ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು, ಕನ್ನಡಕ, ಕಣ್ಣು/ಮುಖಗವಚ (ಶೀಲ್ಡ್) ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.

ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಆಲಸ್ಯ, ಮೂಗಿನ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿ

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವುಂಟಾದರೆ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಕಲುಷಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 2. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅವಶ್ಯಕವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 3. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 4. ನುಂಗಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ವಿಷಪ್ರಾಶನದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ಯಾವುದೇ ನಿಧಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ 1/2 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು. 2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಮರು–ಬಳಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಇರಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 2. ಈ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ, ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. 3. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಆವರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರಬೇಕು, ಗಾಳಿ–ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂತಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆವಿಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ದಗಲ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ:

ಕ್ಲೋರಂಟಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ ಎ.ಐ.	0.40% ತೂ/ತೂ
ಪಾಲಿಯಾಕ್ರಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್	0.40% ತೂ/ತೂ
ನೀರು	0.40% ತೂ/ತೂ
ಡೊಡೆಸಿಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪೋಲಿ (ಆಕ್ಸಿ–1, 2–ಇಥನೆಡಿಲ್) ಫಾಸ್ಫೇಟ್	0.40% ತೂ/ತೂ
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್	1.00% ತೂ/ತೂ
ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ	0.05% ತೂ/ತೂ
ಟಾಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್	8.00% ತೂ/ತೂ
ಮರಳು	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್. % ತೂ/ತೂ
ಒಟ್ಟು:	100.00% ತೂ/ತೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು : ಎನ್‌ಎಸಿಎಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.12-ಎ, "ಸಿ" ಬ್ಲಾಕ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟವರ್ಸ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹಿಲ್ಸ್, ಪಂಜಗುಟ್ಟ, ಹೈದಾರಾಬಾದ್-500 082,
ತೆಲಂಗಾಣ, ಭಾರತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಈಥಕೋಟ - 533 238, ಡಾ.ಬಿ.ಆರಾ. ಅಬೇಡ್ಕರಾ ಕೂನೇಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಭಾರತ.

నాగార్జునా సురక్ష జి ఆర్

క్లోరాన్ట్రినిలిప్రోల్ 0.4% జి ఆర్ కీటక నాశిని

క్లోరాన్ట్రినిలిప్రోల్ 0.4% జి ఆర్ గుళికల రూపంలో ఉన్న ఒక క్రొత్త కీటక నాశిని. ఇది క్లోరాన్ట్రినిలిప్రోల్ 0.4% క్రియాశీల పదార్థం కలిగి ఉంటుంది

సిఫారసులు :

పంట	కీటకం మామూలుపేరు	మోతాదు/ఒక్కో హెక్టారుకు		కావలసిన నీళ్ళు (లీ)	ఆఖరి పిచికారి నుంచి పంట కోసేంత వరకు వేచివుండవలసిన సమయం	పిచికారి తరువాత తిరిగి ప్రవేశించ వలసిన సమయం (గంటల్లో)
		ఎ.ఐ (గ్రాములు	సూత్రీకరణ (మి.లీ)			
వరి	కాండం తొలిచే పురుగు లేదా మువ్వ పురుగు (స్కిర్పోఫేగా ఇన్సెర్టులస్), ఆకు చుట్టు పురుగు (నేఫలోక్రోసిస్ మెడినాలిస్)	40	10		53	
చెరకు	మువ్వ పురుగు (ఖైలో ఇన్ఫస్కేటల్లస్) మరియు టాప్ షూట్ బోర్ (స్కిర్పోఫేగా ఎక్సర్పాలిస్)	75	18.75		147	

ఉపయోగించడానికి సూచనలు: క్లోరాన్ట్రినిలిప్రోల్ 0.4% జి ఆర్ గుళికలను వరిలో ఎకరాకు 4 కిలోలు, చేరకులో ఎకరాకు 7.5 కిలోలు పొలమంతా సరిసమానంగా వెదజల్లండి. చేరకులో నాటిన తరువాత గాళ్ళలో లేదా లేత పిలకల మొదలులో వేసి నీళ్ళు పెట్టండి.

ఉపయోగించవలసిన సమయం: వరిలో నాటిన 15 - 35 రోజులకు, చేరకులో ఎర్లీ షూట్ బోరర్ కి సాళ్ళ మధ్యలో నీరు పెట్టిన తరువాత సిఫారసు చేయ బడినది, టాప్ షూట్ బోరర్ కి, పురుగుల ఆశించిన సమయంలో లేదా ఆశించే నెలలలో ఉపయోగించాలి.

ముందుజాగ్రత్తలు: 1. ఆహార పదార్థాలకు, ఆహార పాత్రలకు మరియు పశువుల మేతకు దూరంగా ఉంచండి. 2. నోటికి, కళ్ళకు మరియు చర్మానికి తగలకుండా చూడండి. 3. పిచికారీ చేసిన తరువాత మలినపడిన దుస్తులను మరియు శరీర భాగాలను బాగా కడగండి. 4. ఉపయోగించే సమయంలో రబ్బరు చేతి తొడుగులు, కళ్ళద్దాలు మరియు ముఖానికి కవచం వంటి పూర్తి రక్షణాత్మక దుస్తులు ధరించండి.

విష లక్షణాలు: బద్ధకం, ముక్కు కారడం మరియు కళ్ళ మసకలు కలుగవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: 1. చర్మము మలిన పడినట్లయితే, మలిన పడిన శరీర భాగాలను సబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రంగా కడగండి. 2. కళ్ళు మలిన పడినట్లయితే, ఎక్కువ నీళ్ళు కళ్ళలో చల్లుకుంటూ కడగండి. కాళ్ళ డాక్టర్ ని సంప్రదించండి. 3.లోనికి పీల్చినట్లయితే, ఏ విధమైన చికిత్స సూచించబడలేదు. 4. మ్రింగినట్లయితే, డాక్టర్ ని సంప్రదించండి.

పంటకు విషతుల్యత: సిఫారసు చేయబడిన దశలో మరియు మోతాదులో ఉపయోగించినట్లయితే పంటకు ఎటువంటి విషతుల్యతా లేదు.

ఉపయోగించిన డబ్బాలను పారవేయుట: 1. ఉపయోగించిన డబ్బాలను / పాకెట్లను నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా భూమిలో 1/2 మీటర్ లోతులో పాతి పెట్టండి. 2. ఉపయోగించిన డబ్బాలను తిరిగి ఉపయోగించకుండా ఉండడానికి బయట పారవేయవద్దు. 3. మిగిలిన పురుగు మందులను మరియు వాటి తొడుగులను, పర్యావరణం మరియు నీటి వనరులు కలుషితం కాకుండా సురక్షితంగా పారవేయండి.

నిల్వ పరిస్థితులు: 1. పురుగు మందులను వాటి అసలు డబ్బాలలోనే, విడి గదులలో, ఇతర వస్తువులకు దూరంగా, పురుగు మందుల స్వభావం మరియు పరిమాణంను బట్టి తాళం వేసిన అల్మారాలలో నిల్వ ఉంచండి. 2. పురుగు మందులచే కలుషితం కాబడిన పరిసరాలలో ఆహార పదార్థాలు తినడం, నిల్వ ఉంచడం, పొగ త్రాగడం చేయవద్దు. 3. పురుగు మందులు నిల్వ ఉంచే గదులు చల్లగా, పొడిగా, బాగా వెలుతురు కలిగినవై, సరియైన కొలతలు కలిగినవై ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం:

క్లోరాన్ట్రినిలిప్రోల్ ఎ.ఐ	0.40% బ/బ
పోలీఅక్రయిల్ ఆసిడ్	0.40% బ/బ
నీరు	0.40% బ/బ
డోడిసైల్ హైడ్రాక్సీ పోలీ(ఆక్సి-1-2-ఈథేన్ డయిల్) ఫాస్ఫేట్	0.40% బ/బ
కాల్షియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్	1.00% బ/బ
డై బ్లూ	0.05% బ/బ
టాల్క్ పౌడర్	8.00% బ/బ
ఇసుక	సరిపడినంత
మొత్తం	100.00% బ/బ

జాగ్రత్తలు : ఈ కరపత్రం/లేబుల్‌పై ఇవ్వబడిన పంటలకు తప్ప ఇతర పంటలకు ఉపయోగించరాదు.

తయారి మరియు మార్కెట్ చేయువారు : ఎన్.ఎ.సి.ఎల్. ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్
ప్లాట్ నం. 12-ఎ, సి బ్లాక్, లక్ష్మీటవర్స్, నాగార్జున హిల్స్, పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్-500 082,
తెలంగాణ, భారతదేశం , ఫ్యాక్టరీ: ఈతకోట - 533 238, డా॥ బీ. ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్.

নাগার্জ্জুনা সুরক্ষা জিআর

ক্লোর‍্যান্ট্র্যানিলিপ্রোল 0.4% ওজন/ওজন জিআর (কীটনাশক)

ক্লোর‍্যান্ট্র্যানিলিপ্রোল 0.4% ওজন⁄ওজন জিআর একটি নতুন ধরনের দানাদার কীটনাশক যাতে সক্রিয় উপাদান হিসাবে ওজন⁄ওজন মাত্রায় 0.4% ক্লোর‍্যান্ট্র্যানিলিপ্রোল রয়েছে।

সুপারিশ ঃ

ফসল	কীটপতঙ্গের সাধারণ নাম	মাত্রা/হেক্টর		জলে দ্রাব্যতা (লিটার)	শেষতম স্প্রে ও প্রতীক্ষাকালের মধ্যবর্তী প্রতীক্ষাকাল (দিন হিসাবে)	প্রতিবার প্রয়োগের পর পুনরায় আবির্ভাব (ঘন্টা হিসাবে)
		সক্রিয় উপাদান (গ্রাম)	প্রস্তুতি (মিলি)			
ধান	হলুদ মাজরা পোকা, (স্কিপোফাগা ইনসার্টুলাস) ধান পাতা মোড়ানো পোকা (ন্যাফালোক্রোসিস মেডিনালিস)	40	10		53	
আখ	অগ্রগাম শূটি ছেদক (চিলোইনফাসকেটালাস) আগা ছেদক (স্কিফোফাগা এক্সার্পটেইলস)	75	18.75		147	

ব্যবহারের নির্দেশিকা: দানাদার ক্লোর‍্যান্ট্র্যানিলিপ্রোল ধানচাষের জমিতে একর প্রতি চার কেজি ও আখ চাষের জমিতে একর প্রতি 7.5 কেজি হিসাবে ছড়াতে হবে। আখ চাষের জমিতে যেখানে শুটি বার হওয়া শুরু হয়েছে সেই হলরেখা বরাবর প্রয়োগ করতে হবে এবং তারপর সেই হলরেখায় জল সঞ্চালন করতে হবে।

প্রয়োগের সময়: 1. ধানচারা রোপনের 15-35 দিন পর। 2. আখচাষের ক্ষেত্রে রোপন ও প্রথম জলসেচনের মধ্যবর্তী সময়ে প্রয়োগ করতে বলা হচ্ছে যাতে আগাম শুটিছেদক ও আগা ছেদক সহ আগাছেদক মথদের আক্রমনকেও একই সাথে মোকাবিলা করা যায়।

সতর্কতা: 1. খাবার, খাবারের খালি পাত্র এবং পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখুন। 2. কীটনাশকটির সাথে মুখগহ্বর, চোখ ও ত্বকের সংস্পর্শ হতে দেবেন না এবং ঘ্রাণের সাথে শরীরে প্রবেশ করতে দেবেন না। 3. দূষিত জামাকাপড় ও শরীরের যে সব অংশে কীটনাশক লেগেছে, সেই সব অঞ্চল ভালোভাবে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। 4. নাড়াচাড়া ও ব্যবহার করারা সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষাদায়ী পোশাক যথা রাবারের দস্তানা, গগলস, চোখমুখের সুরক্ষা আবরণ বজায় রাখতে হবে।

বিষক্রিয়ার উপসর্গ: অবসাদ, নাক দিয়ে তরল বার হওয়া ও ঝাপসা দৃষ্টি।

প্রাথমিক চিকিৎসা : 1. যদি চামড়ায় লেগে গিয়ে থাকে তাহলে সাবান ও জল সহযোগে ধুয়ে ফেলুন । 2. যদি চোখে ছিটে লেগে গিয়ে থাকে তাহলে প্রচুর পরিমান জল দিয়ে ধুয়ে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজন হঐলে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। 3. যদি ঘ্রাণের সাথে শরীরে গিয়ে থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট কোন কিছু করার নেই। 4. যদি গিলে ফেলে থাকে তাহলে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

গাছের বেড়ে ওঠার জন্য প্রতিকূল বিষক্রিয়া: সুপারিশ মান্য করলে এটি গাছের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

প্রতিষেধক: কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। উপ্সর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

ব্যবহৃত ধারকপাত্রগুলির সুষ্ঠু বন্দোবস্ত: 1. ব্যবহৃত ধারকপাত্রগুলিকে ভেঙে ফেলে লোকালয় থেকে অনেক দূরে আধ মিটার গভীরে পুঁতে দিতে হবে। 2. পুনরায় ব্যবহার রোধ করার জন্য ব্যবহৃত ধারকপাত্রগুলিকে বাইরে ফেলে রাখা যাবে না। 3. উদ্বৃত্ত কীটনাশক ও ধারকপাত্রগুলিকে এমন ভাবে নিরাপদ উপায়ে সুবন্দোবস্ত করা দরকার যাতে পরিবেশ ও জলদূষণ ঘটতে না পারে।

সংরক্ষণের শর্তাবলী: 1. যে ঘরে কীটনাশক মজুত করা হবে সেটির গঠন শক্তপোক্ত হওয়া চাই এবং সেটিকে আলো বাতাস চলাচলকারী, যথেষ্ট আলোকিত ও যথেষ্ট বড়োসড়ো জায়গা সমন্বিত হতে হবে যাতে এর বাস্পায়নের ফলে তৈরি হওয়া দূষণ এড়ানো যায়। 2. এই পদার্থটির সংস্পর্শে দূষিত হতে পারে এমন কোন জায়গায় খাবার, পাণীয় অথবা তামাক সংরক্ষণ করবেন না। 3. যে ঘরে কীটনাশক মজুত করা হবে সেটির গঠন শক্তপোক্ত হওয়া চাই এবং তাকে শুকনো, ভালোভাবে আলোকিত, আলো বাতাস চলাচলকারী ও যথেষ্ট জায়গা সমন্বিত হতে হবে।

রাসায়নিক গঠন:

ক্লোর‍্যান্ট্র্যানিলিপ্রোল সক্রিয় উপাদান	0.40% ওজন/ওজন
পলিঅ্যাক্রিলিক অ্যাসিড	0.40% ওজন/ওজন
জল	0.40% ওজন/ওজন
ডোডেসিল হাইড্রক্সিপলি (অক্সি 1,2-ইথেনডাইল) ফসফেটস	0.40% ওজন/ওজন
ক্যালসিয়াম লিগনোসালফোনেট	1.00% ওজন/ওজন
নীল রঙ	0.05% ওজন/ওজন
ট্যাল্ক পাউডার	8.00% ওজন/ওজন
বালি	কিউ.এস ওজন/ওজন
মোট:	100% ওজন/ওজন

সতর্কতাঃ এই লেবেল বা লিফলেটে সুনির্দিষ্ট করা শস্য ছাড়া অন্য শস্যের জন্য ব্যবহার করা

নির্মিত ও বাজারকৃত এর দ্বারা : এনএসিএল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
প্লট নং১২-এ, "সি"-ব্লক, লক্ষ্মী টাওয়ার্স, নাগার্জুন হিল্স, পুঞ্জাগুট্টা, হায়দরাবাদ-৫০০ ০৮২, তেলেঙ্গানা, ভারত
কারখানা: ইথালকোটা -533238, ড. বি. আর. আমবদেকর ক োনাসমিা জলো, এ.পি.

NAGARJUNA
NACL
Be assured

NAGARJUNA
SURAKSHA GR®
Chlorantraniliprole 0.4% w/w GR

INSETICIDE

For Agricultural use
వ్యవసాయ ఉపయోగం కొరకు
कृषि उपयोग के लिए

హెచ్చరిక
सावधान
CAUTION
Green

Keep out of reach of children.
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచవలయును
बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

Keep in cool, dry place away from heat and open flame
దీన్ని చల్లగా, పొడిగాఉన్న చోట వేడికి, మంటలకు దూరంగా నిల్వచేయాలి
सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें

Manufactured & Marketed by :
NACL Industries Limited
CIN:L24219TG1986PLC016607
Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India., Website: www.naclind.com, **Factory :** Ethakota-533 238, Dr. B. R. Ambedkar Konaseema Dist., A.P.

NACL/I/NAGARJUNA SURAKSHA GR/38/SEPT 2023

In case of any complaints, please contact, Consumer Care Cell-Executive, Phone **040-2335 0235**, Email : **customercare@naclind.com NACL INDUSTRIES Limited, Regd. Off.:** Plot No. 12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad-500 082, Telangana, India

Nagarjuna Suraksha GR® is Registered Trade Mark of NACL Industries Limited

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Warranty: The Recommendation made in this literature are offered in good faith based on the results of officially approved private tests. However, no responsibility will be accepted by us for any injury or damage arising from the use of our product as we cannot exercise any control over storage, handling or application.