

Read leaflet before use.

ఉపయోగించేందుకు ముందు కఠినత్రాల్ని చదవండి
वाचन करार आगे लिफलेटि पढ़न।
யுபயோகிப்பதற்கு முன்பு கடும்தரால் படிவாங்கன்
ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ।

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿವರಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಿ.

इस्तेमाल से पहले पर्वे को पढ़ें.
वापरण्यापूर्वी पत्रक वाचा.
ઉપયોગ કરતા પહેલા પરિપત્ર વાંચો.
استعمال سے قبل لیف کھیت کو پڑھ لیں۔

प्रोफेक्स अल्ट्रा

एमामेक्टिन बेंजोएट १.५% + प्रोफेनोफोस ३५% डब्लू० डी० जी० (कीटनाशक)

रासायनिक संरचना: (%भार/भार) एमामेक्टिन बेंजोएट सं० त०: १.५०%; प्रोफेनोफोस सं० त०: ३५%; अन्य घटक – पर्याप्त मात्रा, कुल: १००%, प्रयोजन : कृषि उपयोग के लिए । पुनः प्रविष्टि: 24 घंटे । फसल और कीट समूह: यह संयोजन उत्पाद कपास, मिरच और मक्का की फसल में कीटों का बहु-क्रिया नियंत्रण करता है । विवरण के लिए कृपया पत्रक देखें । खुराक, उपयोग की दिशा, रीति और अनुप्रयोग का समय, विषाक्तता के लक्षण, सुरक्षा सावधानियाँ, प्राथमिक चिकित्सा: जानकारी के लिए कृपया पत्रक देखें । विषनाशक:— 1. रोगी को तुरंत एट्रोपिन दीजिए और इसकी 2 से 4 मि. ग्रा. तक की खुराक 5 से 10 मिनट के अंतराल पर अन्तःशिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज रखिए । एक दिन में एट्रोपिन सलफेट की अधिक से अधिक 25 से 50 मि.ग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है । एट्रोपिन सलफेट की और मात्रा लक्षणों के बराबर रहते दी जा सकती हैं । एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुंह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी है । 2. 1 से 2 ग्राम 2 पी.ए. एम 10 मि.ली. आसुत जल में घोलकर अन्तःशिरा द्वारा बहुत धीरे धीरे 10 से 15 मिनट में देना चाहिए । एमामेक्टिन बेंजोएट गाबा के स्तर को बढ़ाता है, इसलिए गाबा गतिविधि को बढ़ाने वाली दवाओं से बचना चाहिए । सावधानियां कथन: १. उत्पाद मछलियों के लिये जहरीला है, इसीलिए जलजीवों के लिये हानिकारक है; झरनों, नदियों, तालाब, नहर में ना मिलने दें । 2. मधुमक्खियों के लिए विषाक्त । सक्रिय मधुमक्खी पालन अवधि के दौरान स्प्रे ना करें । 3. पत्रिका व लेबल में दिए हुए फसलों व कीटों के अलावा अन्य के लिये उपयोगित नहीं है । 4. पर्वी पर निदिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें ।

Manufactured by: Parijat Industries (India) Pvt. Ltd., Registered office: M-77, 1st & 11nd Floor, M-Block Market, Greater Kailash II, New Delhi - 110048 (India). Factory: Unit 2 (B): Village Khera Gani, Near Village - Fatehgarh, Raipur Rani Road, Distt - Ambala, Haryana-134201, India. Unit 3 (C): 1043, 1042, 1040, 1011, 1009 & 1008, GIDC, Waghodia - 391760, Vadodara, Gujarat.

निर्माता : पारिजात इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्रा. लि., पंजीकृत संस्थान: एम-77, पहला और दूसरा तल, एम ब्लॉक मार्केट ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048 (इंडिया). फैक्ट्री : यूनिट 2 (बी): ग्राम खेरा गनी, नियर ग्राम फतेहगढ़, रायपुर रानी रोड, जिला — अम्बाला, हरियाणा १३४२०१, इंडिया | यूनिट 3 (सी): 1043, 1042, 1040, 1011, 1009 और 1008, जीआईडीसी, वाघोडिया — 391760, वडोदरा, गुजरात |

Marketed by: NACL Industries Limited,

CIN:L24219TG1986PLC016607

Plot No. 12-A, "C" Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Punjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India.

Website: www.naclind.com

First letter of Batch No. Indicates the Plant & Manufacturing Lic. No. Where it is Manufactured.

Regn. No. : **CIR-15531/2022(436)-Emamectin**

रजि. नं : **benzoate + Profenofos (WDG)-1**

Mfg. Lic. No. : Unit-2 (B) : TA/PP/DGA/201314/122

उत्पादन ला. नां : Unit-3 (C) : GJ-VAD-01269

Batch No. :

बैच नं :

Date of Mfg. :

निर्माण तिथि :

Date of Exp. :

उपयोग की अंतिम तिथि :

Max. Retail Price : ₹
(incl. of all taxes)

अधिकतम खुदरा मूल्य : ₹
(सभी करों सहित)

**Net Content }
शुद्ध मात्रा }**

750 g



PROFEX ULTRA™

Emamectin Benzoate 1.5% + Profenofos 35% WDG.



INSECTICIDE

**PROFEX ULTRA**

**EMAMECTIN BENZOATE 1.5% + PROFENOFOS 35% WDG
(INSECTICIDE)**

Composition of formulation/ insecticide: Chemical Composition (%w/w): Emamectin benzoate (a.i.): 1.50%; Profenofos (a.i.): 35.00%; Other ingredients – Q.S to make, Total - 100%, **Purpose:** For Agriculture Purpose only. **Re entry:** 24 hours. **Crop and Pest group:** This combination product offers multi-action control of pests in Cotton, Chilli and Maize crop. Please refer leaflet for details. **Dosage, Direction of use, Manner and Time of Application, Safety Precautions, Symptoms of Poisoning, First Aid:** Please refer leaflets for details. **Antidote:** 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. Emamectin benzoate enhances the GABA levels, therefore drugs enhancing GABA activity should be avoided. **Cautionary statement:** (1) Toxic to fish, hence, harmful to aquatic organism. do not contaminate lakes, rivers, ponds and streams. (2) Toxic to Honeybees. Do not spray during active bee- foraging period of the day. (3) Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. (4) Destroy the container after use as directed on leaflet.

विषणनकर्ता : एन . ऐ . सी . एल . इंडस्ट्रीज लिमिटेड,

प्लॉट नं.12-A, 'C' ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स नागार्जुन हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082, तेलंगाना, भारत.


In case of any complaints, please contact Customer Care Cell Executive, Phone
040-2335 0235

E mail: customercare@naclind.com

Address: NACL Industries Limited, Plot No. 12-A, "C" Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Punjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India. Website:
www.naclind.com

PROFEX ULTRA™ is the Trademark of NACL Industries Limited.

Keep out
of reach of
children.



बच्चों की पहुँच
से दूर रखें।

Keep in cool,
dry place away
from heat and
open flame.

सूखी और ठण्डी
जगह पर आग
और गर्मी
से दूर रखें।

For Agriculture Use Only केवल कृषि उपयोग के लिए

