14 (h) x16 (w) inches

کیمل

کیرجالرفوپ ایتھرال 7.5%+ ایماجھیتھاپار 15% وزن/وزن ای سی (کھرپتوار شکل)

کیرجالرفوپ ایتھرال 7.5% ایماجھیتھاپار 15% وزن/وزن ای سی کے ساتھ مل کر کھرپتوار کی فصل کے لئے ایک وسیع سپکٹرم والا فارمولیشن ہے۔ یہ پودے کی بڑھوتری کو بہتر بناتا ہے اور پودے کی صحت کو برقرار رکھتا ہے۔

استعمال:

فصل	کیمیکل کی مقدار کا نام	ٹرانس لامینار	سسٹمک	آئی پی ایم کا کردار
	کیمیکل کا نام (گرام)	پانی کی مقدار (لیٹر)	پانی کی مقدار (لیٹر)	کیمیکل کا نام (ملی لیٹر فی ایکڑ)
کھرپتوار (کھرپتوار شکل)	90	375-500	437.5	32.81+ 65.625

فصل	کیمیکل کی مقدار کا نام	ٹرانس لامینار	سسٹمک	آئی پی ایم کا کردار
	کیمیکل کا نام (گرام)	پانی کی مقدار (لیٹر)	پانی کی مقدار (لیٹر)	کیمیکل کا نام (ملی لیٹر فی ایکڑ)
مکئی (مکئی، مکئی، مکئی،

14 (h) x16 (w) inches

কিম্বল

কুইজালোফোপ ইথাইল ৭.৫%+ ইমাজিথাপার ১৫% ওজন/ওজন ই.সী.

আগাছানাশক

কুইজালোফোপ ইথাইল ৭.৫% + ইমাজিথাপার ১৫% ওজন / ওজন ই.সী একটি আগাছাকুল বিশেষ যা ঘাসের ওপরে, এককিংবা ঘন এবং নিমজ্জনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

ব্যবহার:

ফসল	আগাছার সাধারণ নাম	মাত্রা/একর			শেষ স্প্রে থেকে ফসল কাটার পর্যন্ত অপেক্ষাকাল (দিন)
		কউ (গ্রা)	লাগুনদ্রব (মিলি)	ওজনিকৃত জল (লিটার)	
চিনাবাদাম	ডাক্টিলোক্টেনিয়াম আজিপ্টিয়াম (কাকজঙ্ঘা), ডিজিটারিয়া সাংগুইনালিস (দাঁড়া ঘাস), ইচিনোক্লোয়া কলোনা (সামা), পেনিসেটাম পলিস্টাকিয়ন (বনবাজরা), ডাক্টাল্লা আজিপ্টিয়াম (কাকজঙ্ঘা)	৩২৫+ ৬৫.৫	৩৪৭.৫	৩৭০-৩৭৫	৯০
সয়াবিন	ডিম্বা আরবিয়া (বড় ঘাস), ডিজিটারিয়া সাংগুইনালিস (দাঁড়া ঘাস), ইচিনোক্লোয়া কলোনা (সামা), পেনিসেটাম পলিস্টাকিয়ন (বনবাজরা), ডাক্টাল্লা আজিপ্টিয়াম (কাকজঙ্ঘা)	৩২৫+ ৬৫.৫	৩৪৭.৫	৩৭০	৭৫

ব্যবহার নির্দেশনা : কুইজালোফোপ ইথাইল ৭.৫% ইমাজিথাপার ১৫% ওজন / ওজন ই.সি। প্রথম প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ফাইটোটক্সিসিটি, উপযুক্ত পানিতে মিশিয়ে, প্রতি সময়ের জন্য ঘোলা করুন, এটি ব্যবহারের ক্রমিক্রমে করুন, প্রত্যন্ত ব্যবহারে নজরে নিয়ে অতি প্রয়োজন নিয়ে ব্যবহার করুন।

এটি ব্যবহারে নির্দেশিত নিয়ে শুরু করবেন না।

সময় এবং ব্যবহারের পদ্ধতি : কুইজালোফোপ ইথাইল ৭.৫% ইমাজিথাপার ১৫% ওজন / ওজন ই.সি একার প্রতি নিমজ্জনের প্রয়োজন। প্রয়োজনে ২ থেকে ৩ পর্যায়ে পর্যায়ে (সপ্তাহের ১০-১৫ দিন) পরে এটি নিয়ে পর্যায়ে। নিবিড় হারে ব্যবহারকারীর ব্যবহার করুন

ব্যবহারের জন্য ফসল অনুপযোগ্যকাল: ৩০ দিন

নিরাপত্তা নির্দেশনা: কুইজালোফোপ ইথাইল ৭.৫% + ইমাজিথাপার ১৫% ওজন / ওজন ই.সি। কুশল দেখাতে অনুসরণ প্রয়োজনীয় পরিচর্যা নিশ্চিত উপযুক্ত পরিমাণে জল ব্যবহার করুন। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে পর্যায়ক্রমিক ব্যবহার করুন এটি প্রস্তুতের নিশ্চিত করুন।

ব্যবহারকারীর সতর্কতা : শেষের ব্যবহারের পরের ফসল কাটার পর্যন্ত অপেক্ষাকাল ১০ থেকে ১৫ দিন।

ব্যবহারের জন্য ফসল অনুপযোগ্যকাল: ৩০ দিন

নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা: শেষের ব্যবহারের পরের ফসল কাটার পর্যন্ত অপেক্ষাকাল ১০ থেকে ১৫ দিন।

পুনরায় প্রয়োগের সময়: ২৪ ঘণ্টা

প্রাক-ফসল কাটার সময়: ৩০ দিন

ডোজিং নির্দেশনা : প্রস্তুতির পরিমাণ অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে এই পণ্যটি নিয়ন্ত্রক নয়। যে পরিস্থিতিতে বিশিষ্টকারীর বিশেষজ্ঞকর্তৃক চেকের ফলাফল উপযুক্ত অনুপযুক্ত হবে - ফসল পরের হওয়ার পরে এবং ফসল কাটার পরের ব্যবহার করেনা না।

কটি এবং ফল: শস্য ব্যবহার করা যাবে না।

ব্যবহারের নিরাপত্তা সমস্যা: ব্যবহারকারী সতর্কতা

ব্যবহার : প্রতি মাস / ফসল প্রতি

সংরক্ষণ : ১) খাদ্যদ্রব্য, খাদ্যদ্রব্যের পশুর রাখা শস্য থাকা থেকে দূরে নিয়ে রাখুন। ২) মূল্য রোধ এবং ক্রমের নীচের প্রভাব থেকে দূরে রাখুন। ৩) শেষের ডিজ নিয়ন্ত্রণের সময় শেষ হলে না যায়। ব্যবহারে নিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে শেষ। ৪) শেষের পরে যেটাকে শস্য শেষের এবং শস্যের শেষ জল ছাড়া দূরে রাখুন। ৫) শেষ করার সময় রোধ নিয়ে ব্যবহার, শস্য করার বা উপযোগ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

নিরাপত্তার উপদেশ ও লক্ষণসমূহ : বিশেষ লোকের সাথে প্রয়োজনে ব্যবহার করা। খাদ্য বাদাম, বাদি বাদি ঘাস, বাদি বাদি ঘাস, অন্যান্য জলে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় কথা নিয়ে পড়ান।

প্রাথমিক চিকিৎসা : ১) শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করুন। যদি বাহির পরিবেশ হয় তাহলে তাজা বিশুদ্ধ বায়ু নিয়ে যান। ২) চামড়ার ও চোখের সংস্পর্শে এলে প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে ধোয়ান। ৩) খাবার গিলে ফেলে দিলে কখনো কোনো অচেতন ব্যক্তিকে মুখে কিছু খাবার দেবেন না। ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

সিমপ্টম এবং লক্ষণ: শ্বাসের জন্য অসুবিধা, বমি বমি ভাব, বমি বমি ভাব, অন্ধ্রতা এবং চোখ এবং ত্বকে জ্বালাপোড়া দেখা দিতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা : ১) শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করুন। যদি বাহির পরিবেশ হয় তাহলে তাজা বিশুদ্ধ বায়ু নিয়ে যান। ২) চামড়ার ও চোখের সংস্পর্শে এলে প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে ধোয়ান। ৩) খাবার গিলে ফেলে দিলে কখনো কোনো অচেতন ব্যক্তিকে মুখে কিছু খাবার দেবেন না। ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

অ্যান্টিডোট : ১) অ্যান্টিডোট নিয়ন্ত্রণ করা। ২) অ্যান্টিডোট নিয়ন্ত্রণ করা। ৩) অ্যান্টিডোট নিয়ন্ত্রণ করা।

সতর্কতা বিবৃতি : ১) খাদ্যদ্রব্য, খাদ্যদ্রব্যের পশুর রাখা শস্য থাকা থেকে দূরে নিয়ে রাখুন। ২) মূল্য রোধ এবং ক্রমের নীচের প্রভাব থেকে দূরে রাখুন। ৩) শেষের ডিজ নিয়ন্ত্রণের সময় শেষ হলে না যায়। ব্যবহারে নিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে শেষ। ৪) শেষের পরে যেটাকে শস্য শেষের এবং শস্যের শেষ জল ছাড়া দূরে রাখুন। ৫) শেষ করার সময় রোধ নিয়ে ব্যবহার, শস্য করার বা উপযোগ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত