

Hexaconazole 5% S.C
Nagarjuna Mass Plus
Systemic Fungicide

Nagarjuna Mass Plus is systemic fungicide used for the control of powdery mildew of Mango, Grape and sheath blight of Rice.

Chemical Composition: Hexaconazole technical (Based on 92% w/w min.)	5.43% w/w
Propylene glycol	5.00%w/w
Emulsifier A (Blend of poly oxy ethylene, poly oxypropylene ethers & Calcium salt of alkyl benzene sulfonate)	3.00%w/w
Emulsifier B (Amine salt of poly alkyl aryl ether phosphate)	3.00%w/w
Emulsifier C (Alkyl phenyl poly ethoxy ethanol)	2.50%w/w
Wetting & dispersing agent (sodium salt of fatty alcohol)	2.50%w/w
Potassium phosphate	10.00%w/w
Polysaccharide	0.20%w/w
Defoamers	0.25%w/w
Distilled/D.M. Water	68.12%w/w
Total	100.00%w/w

Name of Crop	Common name of disease	Dosage per hectare a.i. (ga/%)	formulation (ml%)	Dilution in water (Lt.s)	waiting period from last spray to harvest (days)
Mango	Powdery mildew	0.01% or 10g/100 lt. water	0.2% or 200 ml/100 lt. water	As required depending on size of tree and plant protection equipment used	27
Rice	Sheath blight	0.01%or 10g/100 lt. water	0.2%or 200 ml/100 lt. water	As required depending on size of corp and plant protection equipment used	40
Grapes	Powdery mildew	25-50	500-1000	500	14

Direction of use :

a) Preparation of spray mixture: Take the required quantity of Hexaconazole 5% SC, dilute with a little water and stir well using a stick. Then add the remaining quantity of water as per spray volume required and mix well again by stirring

b) Plant protection equipment: Use knapsack sprayer, foot sprayer, Compression, Knapsack sprayer, Compression knapsack battery sprayer or ASPEE HTP sprayer.

c) Compatibility: Nagarjuna Mass Plus is compatible with commonly used insecticides and fungicides.

Precautions:

- Keep away from food stuffs, empty foodstuff containers and animals food.
- Avoid contact with mouth, eyes and skin.
- Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
- Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
- Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
- Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Limitations and Cautions for Use: Do not use in those situations if there is possibility or harming bees and fish, livestock, game. Wild birds and animals.

Symptoms of Poisoning: Nervousness, anxiety, tremour, convulsion and allergic manifestations.

FirstAid:

- If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
- If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
- If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
- If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Phytotoxicity: Nagarjuna Mass Plus is not phytotoxic when used as per recommendations.

Disposal of Used containers: 1. Packages or surplus material and washing from the machine and containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: The packages containing the fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending on the quantity and the nature of the insecticide.

2) The store-room should be well built, well lit, ventilated and sufficient in dimensions. The conditions of the store should be dry and cool.

CAUTION : Not to be used on crops other than specified on this leaflet
Manufactured by : NACL Industries Limited
(formerly known as 'Nagarjuna Agrichem Limited')
Regd.Off.: Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta,Hyderabad - 500 082, Telangana, India.
Factory: Ethakota-533 238, E.G. Dist., A.P.

హెక్సాక్సానాజోల్ 5% ఎస్.సి
నాగార్జున మాస్ ప్లస్
అంతర్వ్యాపక శీలీంధ్రనాశని

నాగార్జున మాస్ ప్లస్ (హెక్సాక్సానాజోల్ 5% ఎస్.సి) ఒక అంతర్వ్యాపక శీలీంధ్రనాశని. ఇది పరినాశించే పాము పాడ తెగులు మరియు మామిడి,ద్రాక్షనాశించే బూజా తెగులును అరికడుతుంది.

రసాయన మిశ్రమము:	% బ/బ
హెక్సాక్సానాజోల్ టెక్నికల్ (కనీసం 92% బ/బ మీద ఆధారితం)	5.43
ప్రోపీలీన్ గ్లీసిల్	5.00
ఎమల్సిఫయర్ ఎ (బ్లెండ్ ఆఫ్ పాలీ ఆక్వీ ఎథిల్ సెల్ సాలీ గ్లైకోసైలీస్ ఈథర్స్ మరియు కార్బియం సాల్ట్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేట్)	3.00
ఎమల్సిఫయర్ బి (ఎమ్మిస్ సాల్ట్ ఆఫ్ పాలీ ఆల్కైల్ ఈథర్ ఫాస్ఫేట్)	3.00
ఎమల్సిఫయర్ సి (ఆల్కైల్ ఫ్స్ఫైల్ పాలీ ఎథోక్సీ ఎథర్నాల్)	2.50
వెట్టింగ్ మరియు డిస్పర్సింగ్, ఏజెంట్ (సాడియం సాల్ట్ ఆఫ్ ఫ్ఫాటీ ఆల్కహాల్)	2.50
పాలిషియం ఫాస్ఫేట్	10.00
పాలీసాక్రెడ్	0.20
డిఫోమర్	0.25
డిస్టిల్డ్ డి. ఎమ్. వాటర్	68.12
మొత్తం	100.00

పంట పేరు	తెగులు	హెక్టారుకు మోతాదు		నీటి పరిమాణము (లీటర్లలో)	ఏదో స్ప్రే నుండి కోతకాలం వరకూ పేచీ ఉండవల్సిన సమయం(రో.)
		స.ప. (గ్రా.%)	సూత్రికరణ (మి.లీ.%)		
మామిడి	బూడిద తెగులు	0.01 % లేదా 100 లీటర్లలో 10గ్రా.	0.2% లేదా 100 లీటర్లలో నీటిలో 200మి.లీ.	పెట్టు సైజు మరియు వాడి సస్పెంక్షణ పరికరాలనుబట్టి ఉపయోగించాలి	27
పరి	పాముపాడ తెగులు	0.01 % లేదా 100లీటర్లలో 10 గ్రా.	0.2%లేదా 100 లీటర్లలో నీటిలో 200 మి.లీ.	పంట సైజు మరియు వాడి సస్పెంక్షణ పరికరాలను బట్టి ఉపయోగించాలి	40
ద్రాక్ష	బూడిద తెగులు	25-50	500-1000	500	14

వాడే పద్ధతి :

1) స్ప్రే ద్రావకము తయారు చేసుకోవడం:

కాపల్సినంత పరిమాణంలో హెక్సాక్సానాజోల్ 5% ఎస్.సి తీసుకొని, దానికి కాస్తంత పరిమాణంలో నీరు కలిపి బాగా కలియబెట్టడై చిక్కని ద్రావకాన్ని మందు తయారు చేసుకోవాలి. అటు పిమ్మట మిగతా నీటిసంతా కలిపి నీ బాగా కలియబెట్టుకోవాలి.

2) సస్పెంక్షణ పరికరాలు:

న్యూప్స్పాక్ స్ప్రేయర్, పుట్ స్ప్రేయర్, కంప్పస్ న్యూప్స్పాక్ స్ప్రేయర్, కంప్పస్ న్యూప్ స్పాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ లేదా ఆస్ప్రే-హవేటిప్ స్ప్రేయర్లను వాడండి.

3) అనుగుణ్యత: హెక్సాక్సానాజోల్ 5% ఎస్ పి సర్వసాధరణంగా వాడబడి అన్ని రకాల కీటకనాశనులు మరియు శీలీంధ్రనాశనులతో అనుగుణ్యత కలిగి ఉంటుంది.

ముందుజాగ్రత్తలు:

- ఆహార పదార్థాలకు, ఖాళీ ఆహార పదార్థాల కంటెయినర్లకు మరియు జంతువుల ఆహారానికి దూరంగా ఉండండి.
- నోటికీ, కళ్ళకు మరియు చర్మానికి తగలవివద్దండి.
- వీహారీ తుండరలను పీల్చకండి. గాలి వీచే దిశలో వీహారీ చేయండి.
- వీహారీ తరుచుకు మరిచిపడిన దుస్తులను బాగా ఉతకండి మరియు శరీర భాగాలను కడగండి.
- వీహారీ చేసేటప్పుడు ధూమపానం, మధ్యపానం చేయకూడదు, తినకూడదు మరియు ఏదీ నమలకూడదు.
- మిశ్రమం మరియు వీహారీ చేసేటప్పుడు రక్షణాత్మక దుస్తులు ధరించాలి.

వాడుకలో పరిమితులు: ఒక వేళ దీన్ని జల్లుకోవడం వలన తేనెటీగలు, చేపలు, పాడిపశువులు, క్షరమృగాలు, అడవి జంతువులు, పక్షులు ఇలాంటి వాటికి మైదాన హరిగి సరిస్థితులుంటే అటుల చేయరాదు.

విషలక్షణాలు: నరాల బలహీనత, ఆతురత, ఒణుకుట, మెలితరగటం మరియు అలెర్జీ లక్షణాలు.

ద్రావణమిక దిశ్యత :

- ఒకేరే డ్రైంగిత్, గొంతు నెమక కిశకితలు పెట్టడు ద్వారా వాంతులు తీప్పింపండి. వాంతులు ఆగితానకే వరకు తిరిగిచేయండి. రోగి అపహర్షస్థితిలో ఉంటే వాంతులు తీప్పింపవద్దు.
- దుస్తులు మరియు చర్మం మరిచిపడితే, దుస్తులు తీసివే, తగినంత మత్తంతో నమ్మి మరియు నీటితో మరిచిపడిన చర్మాన్ని కడగండి.
- కళ్ళు మరిచిపడితే, దాచావు 10 నుంచి 15 నిమిషాల సేపు సెర్టిఫ్ / పరిశుభ్రమైర్ నీటిని పుష్పలంగా కళ్ళకు కాట్టుకుంటూ ఖుభవరమకోవాలి.
- నీటికీ, రోగి నాశా గాలి తగిలే వోటుకు తిమిరవ్వండి.

విరుగుడు : నిర్దిష్టమైన విరుగుడు ఏమిటో తెలియదు. లక్షణాలను బట్టి నిశ్చయించండి.

మొక్కలపై విష ప్రభావము: హెక్సాక్సానాజోల్ను సెపారురు చేయబడిన రీతిలో వాడినట్లయితే మొక్కలపై ఏవిధమైన విషప్రభావం ఉండదు.

ఖాళీ డబ్బాలను పారచేయు విధానము:

- ఖాళీ డబ్బాలను, మిగిలిపోయిన మందు లేదా పరికరాలు కడుగగా పచ్చిన నీటిని కడుజుగ్రత్త పోసాస్తూ అంటే పరిసరాలు నీరు, నీటి వనరులేమీ కలుపితం కాకుండా పారచేసుకోవాలి.
- ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఏవిధంగాను వాడరాదు. కనుక వాలీనలా బయట వదిలేయరాదు.
- పాక్వీజీలు లేదా డబ్బాలను సగులకోట్టి మనుష్యు సంచారానికి దూరంగా పాతిపట్టాలి.

నిలువ పుంచట :

- ఈ శీలీంధ్రనాశని గల పాక్వీజీలను వాటి యొక్క ఒరిజినల్ ప్యాక్సిల్లోనే ఉంచి, ఇతర పదార్థములు అంటే మరిమొఖ్యంగా ఆహార పదార్థములు, పశువుల దాణాలను నిల్వ చేసే గదులలో కాకుండా చేయవేరుగా వాటి యొక్క సైజుము మరియు పరిమాణాన్ని బట్టి పేరుపేరు అలమరాలలో పట్టి తాళంపేసి మూత్రమే నిల్వ చేయాలి.

- వీటిని నిల్వ చేసే గదులు మంచి గట్టి కట్టడములై, విశాలంగా, గాలి, వెలుతురు ప్రసరించేలా ఉండాలి మరియు ఆ గదులు లేదా అవరణలు పాడిగా, పల్లగా ఉండాలి.

బాగ్రుత్తలు: ఈ కరపత్రం పై పుష్ప పంపట కాకుండా ఇతర పంపట మీద వాడరాదు.

తయారు చేయువారు : ఎన్.ఎ.సి.ఎల్. ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్
(పూర్వస్య) నాగార్జున అగ్రికెమ్ లిమిటెడ్)
ఫ్లోట్ నం. 12-ఎ, సి బ్లాక్, లక్ష్మీటర్స్, నాగార్జున హిల్స్, పంజాగట్టా, హైదరాబాద్-500 082, తెలంగాణ, భారతదేశం , ఫ్లోటె: ఈతకోట-533 238, టూ.గి. శీర్షా, ఆంధ్రప్రదేశ్.

हेक्साकोनाजोल ५% एस.सी.
नागार्जुना मास प्लस
अन्तर्वाही फफुंंदीनाशक

नागार्जुना मास प्लस एक अन्तर्वाही फफूंदीनाशक है जिसका प्रयोग आम,अंगूर का चूर्ण आसिता रोग और धान का पर्णच्छद आंगमारी रोग के रोकथाम के लिए किया जाएगा ।

पदार्थ प्रमाण:	भार/भार
हेक्साकोनाजोल टेक्निकल (भारानुसार ९२% शुद्धता के आधार पर)	५.४३%
प्रोपालिन ग्लाइकाल	५.००%
एमल्सिफायर - ए (पालि आक्सिइथालिन, पाली आक्सिप्रोपालिन ईथर एवं काल्सियम साल्ट का आल्काइल बेंज़िन सल्फोनेट का ब्लेंड)	३.००%
इमल्सिफायर-बी (पालि आल्कइल एराइल ईथर फॉस्फेट का अमाइन साल्ट	३.०० %
एमल्सिफायर-सी (आल्काइल फिनाइल पालिइथक्सि थानोल)	२.५० %
वेटिंग एवं डिसपर्सिंग एजेंट (फ्पटी आल्कोआल का सोडियम साल्ट)	५०.००%
पोटासियम फासफइट	१०.०० %
पालिसखराइड	०.२०%
डिफोमर	०.२० %
आसुत /डी.एम. जल	६८.१२ %
योग	१००.०० %

सिफारिशें :

फसल	रोग के साधारण नाम	मात्रा प्रति हेक्टर		आखिरी पानी की मात्रा (लीटर)	छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतर(दिन)
		मुख्य तत्व (ग्राम /%)	संरचना (मि.ली. /%)		
आम	चूर्ण असिता रोग	०.०१% या १० ग्राम/१०० ली. पानी	०.२% या २०० मिली/१०० ली.पानी	पेड़ के आकार और स्प्रयर के प्रयोग के अनुसार	२७
धान	पर्णच्छद आंगमारी रोग	०.०१% या १० ग्राम/१०० ली.पानी	०.२% या २०० मिली/१००ली.पानी	फसल के आकार और स्प्रयर के प्रयोग के अनुसार	४०
अंगूर	भस्मी फफूंद	२५-५०	५००-१०००	५००	१४

प्रयोग के लिये निर्देश :

(अ) **छिड़काव घोल की तैयारी:** हेक्साकोनाजोल ५ % एस.सी. की निर्धारित मात्रा को पहले थोड़े पानी में अच्छी प्रकार मिलाए उसके बाद पानी की आवश्यक मात्रा जो निर्धारित की गयी हो मिलाए और छड़ी या छड़ से अच्छी प्रकार मिलाए ।

(ब) **फसल सुरक्षा यंत्र :** नेपसैक स्प्रयर, फुट स्प्रयर, कम्प्रेसन नेपसैक स्प्रयर, कम्प्रेसन नेपसैक बैटरी चलता स्प्रयर, या एस पी एच टी पी स्प्रयर का प्रयोग छिड़काव के लिए करें ।

(य) **अनुरूपता:** हेक्साकोनाजोल ५% एस.सी. आमतैर पर प्रयोग में आनेवाले सभी फफूंदनाशक और कीटनाशक के साथ मिलाय जा सकता है ।

सावधानियां:

- खाद्यपदार्थों, खाद्य –सामग्रियों के खाली डिब्बों और पशु आहारों से दूर रखें.
- मुंह, आंखों और त्वचा पर लगने से बचाएं.
- छिड़काव की फुहार को सांस द्वारा शरीर के अंदर जाने से बचाएं. हवा की दिशा में छिड़काव करें.
- छिड़काव के बाद प्रदूषित कपड़े और शरीर के हिस्सों को अच्छी तरह धो लें.
- छिड़काव करते समय न तो धूम्रपान करें और न ही कुछ खाएं –पीएं.
- घोल बनाते और छिड़काव करते समय पूर्ण सुरक्षाकारी कपड़े पहनें.

प्रयोग की सीमाएं एवं चेतावनी: अगर मधुमक्खी, मछली, पालतू जानवरों, खेल, जंगली चिड़ियाँ एवं जानवरों को हानी की सम्भवन हो एसी स्थान पर छिड़काव न करें ।

ज़हर के लक्षण : घबराहट, आकुलता, कंपकंपी, रूँठ और अलर्जी के लक्षण ।

प्राथमिक उपचार :

१. अगर दवा निगल ली गई हो तो गले के पीछे की तरफ गुदगुदी करके उलटी कराएं. इसे तब तक दोहराते रहें जब तक कि उलटी का रंग साफ न हो जाए. अगर रोगी बेहोश हो तो उलटी कराते की कोशिश न करें.

२. अगर कपड़े और त्वचा प्रदूषित हो गई हों तो कपड़ों को उतार दें तथा प्रदूषित त्वचा को साबुन और पानी की भरपूर मात्रा से अच्छी तरह धोएं.

३. अगर आंखें प्रदूषित हो जाती है तो सलाइन / स्वच्छ पानी से आंखों को १० से १५ मिनट तक अच्छी तरह छाछपाएं.

४. अगर दवा को निगल लिया गया हो तो रोगी को खुली हवा में ले जाएं.

औषधोपचार :

कोई विशेष औषधोपचार ज्ञात नहीं है. लक्षण के अनुसार उपचार करें.

फलक पर असर: हेक्साकोनाजोल ५% एस.सी.की बतायी गयी मात्रा का प्रयोग करने पर फसल पर नहीं पड़ता हैं ।

खाली डिब्बों का निपटारा:

१) डिब्बों या बचा हुआ सामान और मशीन की धुलाई से आई घोल तथा अन्य वाहक किसी सुरक्षित स्थान पर फेंके जिससे वातावरण और पानी को दूषित होने की संभावना न हो ।

२) प्रयोग में आयी डिब्बों को बाहर न छोड़े और ना ही दुबारा प्रयोग करें ।

३) खाली डिब्बों को तोड़कर बस्ती से दूर जमीन में गाड़ देने चाहिए ।

भण्डारम और प्रयोग के लिए सुझाव:

१. डिब्बें जिसमें फफूंदीनाशक हो उसको किसी अलग कमरे में जिस में और कोई चीज न रखी जाती हो जैसं खाद्य पाने की चीजें तथा कमरा थोड़ी दूर में हो या किसी अलग अलमारी में उसकी मात्रा तथा स्वभाव के अनुसार ताला लगाकर रखें ।

२. संग्रहालय अच्छी तरह से बना हुआ हो जिसमें हवा एवं प्रकाश का उचित भाग मिलती रहे और संग्रहालय का आकार भी एसा हो जिसमें काफी जगह हो । कमरे में नमी न हो और ठंडा हा

सावधान: इस निर्देश पत्रिका में निर्देशित ना किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें.

उत्पादक: ऐन.ऐ.सी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(पूर्व में नागार्जुना अग्रिकेम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
प्लॉट नं. १२-ए, सी ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स, नागार्जुना हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद-५०० ०८२, तेलंगाणा, भारत
कर्मगार: ईनकोटा-५३३ २३८, तु.गो. जिल्ला, आंध्रप्रदेश.

ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಾಜೋಲ್ 5% ಎಸ್.ಸಿ
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಾಸ್ ಪ್ಲಸ್
ಅಂತರವ್ಯಾಪೀ ಶೀಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಭತ್ತ-ಹೊಟ್ಟೆಸ್ರದಾಕ್ಷಿ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗೆ ತಗಲುವ ಬೂದಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಅಂತರವ್ಯಾಪೀ ಶೀಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

ಸಂಯೋಜನೆ:	% ತೂಕ/ತೂಕ
ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಾಜೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ (92.00 % ತೂಕ/ತೂಕ, ಕನಿಷ್ಠಶುದ್ಧತೆಯ ಧಾರದಲ್ಲಿ)	5.43
ಪ್ರೋಪೈಲೀನ್ ಗ್ಲೈಸೆಲ್	5.00
ಇಮಲ್ಸಿಫಾಯರ್ ಎ.(ಪಾಲಿಇಥಿಲೀನ್ ಪಾಲಿಪ್ರೋಪಿಲೀನ್ ಈಥರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆಂಝೀಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ಅಮೈನ್)	3.00
ಇಮಲ್ಸಿಫಾಯರ್ ಸಿ(ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫಿನ್ಯಾಲ್ ಪರ್ವೇ ಇಥೋಕ್ಸಿ ಈಥರ್ ನೋಲ್)	2.50
ಒದ್ದೆಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಚದರಿಸುವ ಘಟಕ(ಫ್ಲಾಟಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಡ್)	2.50
ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಮ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್	10.00
ಪಾಲಿಪ್ಯಾಕ್ರೈಡ್	0.20
ಡಿಸ್ಪೋಮರ್ (ನೋರೆನೋಡಿ)	0.25
ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಡಿಮಿನಲ್ನೈಡ್ ನೀರು	68.12
ಒಟ್ಟು	100.00

ಶಿಫಾಕಮಗಳು :

ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರು	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಒಂದರ ಪ್ರಮಾಣ		ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಕೇತುಗೊಳಿಸಲು ನೀರು (ಲೀಟರ್)	ಬಳಕೆ ತೊಯಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ(ದಿನಗಳು)
		ಸ.ಘ(ಗ್ರಾ%)	ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ (ಮಿ.ಲೀ%)		
ಮಾವು	ಬೂದಿರೋಗ	0.01% ಅಥವಾ 10 ಗ್ರಾ 100ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ	0.2% ಅಥವಾ 200 ಮಿ.ಲೀ/ 100ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ	ಮದವಗಾತ್ರ ಸಿಂಪರಣಾ ಹಾಗೂ ಬಳಸುವ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ	27
ಭತ್ತ	ಹೊಟ್ಟೆಸ್ರ ಅಂಗಮಾರಿ	0.01 % ಅಥವಾ 10 ಗ್ರಾ 100 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ	0.02 % ಅಥವಾ 200ಮಿ.ಲೀ/ 100 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ	ಬೆಳೆಯಾಗುತ್ತ ಸಿಂಪರಣಾ ಹಾಗೂ ಬಳಸುವ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ	17
ದಾಕ್ಷಿ	ಬೂದಿರೋಗ	25-50	500-1000	500	14

ಉಪಯೋಗದ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು :

ಎ) ಸಿಂಪರಣಾ ಮಿಶ್ರಣದ ತಯಾರಿ: **ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಾಸ್ ಪ್ಲಸ್**ಯ ಅವಶ್ಯಕಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ತೆಳುಗೊಳಿಸಿರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಲೊಂದನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಕೆದಕಿರಿ. ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಿಂಪರಣಾ ಪರಿಮಾಣದನುಸಾರ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಳಿದನೀರು ಹಾಕಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆದಕಿರಿ.

ಬಿ) **ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣ:** ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಯರ್, ಫ಼ರಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಸ್ಸನ್ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಟ್ರೇಯರ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸ್-ಎಬ್ ಟಪಿ ಸ್ಟ್ರೇಯರ್ ಬಳಸಿರಿ.

ಸಿ) **ಹೊಂದರಣೆ:** ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಶೀಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಾಜೋಲ್ 5% ಎಸ್ ಸಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಪಡೆದಿದೆ.

ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆಗಳು :

- ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಬದಿದಾದ ಕಂಚ್ಚಿನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿರಿ.
- ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವಕ್ಕೆಗೆ ಸಿಂ

