நாரிலாந

ஆக்ஸிஃப்ளோர்ஃபென் 23.5% ஈ.சி
(செலக்டிவ் களைக்கொல்லி)

ஆக்சி.ஃப்ளோர்.ஃபென் 23.5 % E.C. என்பது தேர்வு செய்து அழிக்கும் களைக்கொல்லி ஆகும், இது ஆக்சி.ஃப்ளோர்.ஃபென் என்னும் வீரியமிக்க முலகப் பொருளை 23.5 % E.C. என்ற அளவில் கொண்டுள்ளது. இது நெல் (நேரடி விதைப்பு), தேயிலை, உருளைக் கிழங்கு, வெங்காயம் மற்றும் நிலக்கடலை போன்ற பயிர்களைத் தாக்கும் முக்கிய களைகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

பரிந்துரை :
பிரதி ஹெக்டேருக்கு மருந்தளவு

பயிர்(பயிர்கள்)	களைகளின் சாதாரணப்	பொர்.எ. (கிராம்கள்)	ாாழங்கள (மிலி)	நீர்க்க வைப்பதுகடைசி (லிட்டர்களில்)	ஸ்ப்ரேயில் இருந்து இடைப்பட்ட காலம் (நாட்களில்)
நெல்(நேரடி விதைப்பு) பயிர் எழுவதற்கு முன்பாக	எக்கலோக்காவா வகை சைப்ரஸ் இரீபா எக்லிப்டா ஆல்பா	150-240	650-1000	500	
தேயிலை	டொகாடரியா, இம்பெரட்டா பாஸ்பாலம், பெரேரியா ஹிஸ்பிடா	150-250	650-1000	500-750	15 நாட்கள்
நிலக்கடலை	எக்கைனோக்காவா கொலோனம் டிஜிடேரியா ஆஜ்ஜேட்டா	100-200	425-850	500-750	
உருளைக் கிழங்கு	கினோபோடியம், கொரோனோபஸ், ஹேலியோஸாரம்பியம், டிரையாந்தீமா, சைப்ரஸ்	100-200	425-850	500-750	
வெங்காயம்	கினோபோடியம், அமராந்தஸ் விடிஃபல்	100-200	425-850	500-750	

தெளிக்கும் காலம் :
பயிர் எழுவதற்கு முந்தைய காலத்தில் தெளிக்க வேண்டும். நாற்றுப் பாவியதில்/பயிரிட்டதில் இருந்து 3-4 நாட்களுக்குள் உபயோகிக்கவும்.
பயிர்ப் பாதுகாப்பு உபகரணம் : பாரம்பரிய முறையில் தெளிப்பதற்கு (உயர்வான கனஅளவில் தெளிப்பதற்கு). வயலில் பயிர் இருக்கையில், தண்ணீரின் அளவானது மேலே இருக்கும் வகையில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்ப்ரேயர்கள் பக்கெட் பம்ப் ஸ்ப்ரேயர், ஸ்டிரர்ப் பம்ப் ஸ்ப்ரேயர், நாப்சேக் ஸ்ப்ரேயர், வீல்-பாரோ ஸ்ப்ரேயர், கம்ப்ரெசன் நாப்சேக் ஸ்ப்ரேயர் போன்றவை ஆகும். ஸ்ப்ரேயரை ஃபிளாட் ஜெட் நாசில் அகலது ஃபிளாட் பேன் உடன் பயன்படுத்தவும். நாசிலை, தரை அளவில் இருந்து நிலையான உயரத்தில் வைத்திருக்கவும். தெளிக்கும் பொழுது நேர் கோட்டில் சீரான வேகத்தில் தெளிக்கவும்.
முன்னெச்சரிக்கைகள் :
1. உணவுப் பண்டங்கள், காலியான உணவுப் பண்டங்களின் கொள்கலன்கள் மற்றும் செல்லப் பிராணிகளுக்கான உணவு ஆகியவற்றில் இருந்து தொலைவில் வைத்திருக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோல் மீது மருந்து படாதவாறு தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரே செய்த துகள்களை சுவாசிப்பதை தவிர்க்கவும். காற்றின் திசையில் ஸ்ப்ரே செய்யவும். 4. தெளித்து முடிந்ததும், மருந்து பட்ட துணிமணிகளை மற்றும் உடலின் பகுதிகளை நன்கு கழுவவும்.
5. தெளிக்கும் பொழுது புகைக்க வோ, பானம் அருந்த வோ, எதையாவது மெல்லுவதோ கூடாது. 6. மருந்தைக் கலக்கும் பொழுதும் ஸ்ப்ரே செய்யும் பொழுதும் உடலை முழுவதும் மூடும் வகையில் பாதுகாப்பான உடையை அணிந்திடுங்கள்.

விஷஅறிகுறிகள் :
தோல், கண்கள் மற்றும் சுவாசப் பாதையில் முதற்கட்ட எரிச்சல் உணர்வு.
முதல் உதவி
மருந்தைக் கையாண்ட பின்னர் நன்கு கழுவவும். ஒரு வேளை மருந்து உடலின் மீது பட்டு விட்டால், நிறைய தண்ணீர் மற்றும் சோப் கொண்டு தோலைக் கழுவவும். கண்கள் மீது மருந்து பட்டு விட்டால், நிறைய தண்ணீரைக் கொண்டு கண்களைக் கழுவுங்கள். மருத்துவ கவனிப்பை பெறுங்கள்.
விஷமுறிவு மருந்து :
சிகிச்சைக்கு முன்பு ஒரு மணி நேரத்திற்கும் குறைவாக, சிறிய அளவில் மருந்தை உட்கொண்டிருந்தால் (ஒரு கிலோ உடல் எடைக்கு 1.0 மி.லி. என்ற அளவில்) கீழ்க்கண்ட முறையில் சிறப்பாக சிகிச்சை செய்யலாம்:
i) இப்பிகாக் சிரப் திரவம் சிறிது அருந்தி அதைத் தொடர்ந்து 1-2 கிளாஸ் தண்ணீரை அருந்துதல். வயது வந்தவர்கள் மற்றும் 12 வயதுக்கு மேற்பட்ட சிறுவர்களுக்கு மருந்து டோஸ் 30 மிலி ஆகும். 12 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு டோஸ் 12 மிலி ஆகும். ii) வாந்தி நின்றதும், குழாய்த் தண்ணீரில் 30-50 கிராம் ஆக்டிவேட்டட் கரியைக் கரைத்து பசை போல ஆக்கி தரவும். iii) குழாய்த் தண்ணீரில் சோடியம்/மெக்னீசியம் சல்பேட் 0.25கிராமைக் கலந்து மலமிளக்கியாகத் தரவும். அறிகுறிகளுக்கு நற்றவாறு சிகிச்சை தரவும்.
உபயோகப்படுத்திய கொள்கலன்களை அகற்றுவது :
1. உபயோகப்படுத்திய பொட்டலங்களை மறுபடியும் பயன்படுத்துவதைத் தடுத்திடும் வகையில் அவற்றை வெளியே போட்டு விடக்கூடாது. 2. அந்த பொட்டலங்கள் நொறுக்கப்பட்டு வசிக்கும் இடத்திற்கு அப்பால் புதைக்கப்பட வேண்டும். 3.சுற்றுச்சூழல் அல்லது தண்ணீர் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்கும் வகையில் அந்த பொட்டலங்கள் அல்லது மீதமிருக்கும் மருந்துப் பொருட்கள் மற்றும் மருந்து தெளித்த ஸ்ப்ரேயரைக் கழுவிய நீர் ஆகியவை பாதுகாப்பான முறையில் அகற்றப்பட வேண்டும்.
சேமிக்கும் நிலைகள் : 1. களைக்கொல்லிகள் கொண்ட பொட்டலங்கள் தனியான அறைகளில் அல்லது உணவு மற்றும் விலங்குகளுக்கான உணவு அல்லது பிற களைக்கொல்லி மருந்து இருக்கும் அறைகளுக்கு அப்பால் இருக்கும் அலமாரிகளில் அந்த களைக்கொல்லிகளின் அளவு மற்றும் தன்மைக்கு ஏற்ப பூட்டு சாவி பாதுகாப்புடன் சேமிக்கப்பட வேண்டும். 2. அந்த களைக்கொல்லியைச் சேமிப்பதற்கான அறை அல்லது இடமானது நன்கு கட்டப்பட்டதாக, உலர்ந்த, குளிர்ச்சியானதாக, நன்கு காற்றோட்ட வசதியுடன், மருந்தின் ஆவியால் மாசுபடாதவாறு போதிய நீள அகலம் உள்ள அறைகளாக இருக்க வேண்டும்.
ரசாயனக் கலவை :

ஆக்சி.ஃப்ளோர்.ஃபென் டெக்.(குறைந்த பட்ச தூய்மை 70% எ/எ.)	33.600 % எ/எ.
எமல்சிபையர் : கேல்சியம் ஆல்கைல் ஆரில் சல்போனிக்	10.200 % எ/எ.
பாலிஆக்சி எத்திலீன் ஈதர் சைக்ளோஹெக்ஸானோன்	13.400 % எ/எ.
கரைப்பான் : ஸைலீன்	42.800 % எ/எ.
மொத்தம் :	**100.000 % எ/எ.**

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிட்டு இருக்காத பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

தயாரிப்பாளர்கள் : என்ஏசிஎல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்
(முன்னர் 'நாகார்ஜுனா அக்ரிகெம் லிமிடெட்' என்று அழைக்கப்பட்டது)
பிளாட் எண் 12-அ, 'C'-பிளாக், லக்ஷுமி டவர்ஸ், நாகார்ஜுனா ஹில்ஸ், புஞ்சகுட்டா, ஹைதராபாத் - 500 082, தெலுங்கானா, இந்தியா
ஆந்திரப் பிரதேசம், இந்தியா.
ஃபேக்டரி : எதாகோட்டா - 533 238, ஆந்திரப் பிரதேசம், இந்தியா.

नैरीलॉन

आक्सीफ्लोरफेन २३.५% ई. सी.
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

आक्सीफ्लोरफेन २३.५ प्रतिशत ई.सी. (भार/भार)
(चयनात्मक खरपतवारनाशक) आक्सीफ्लोरफेन २३.५ ई.सी. एक चुनिंदा खरपतवार नाशक है जिसमें ओक्सीफ्लोरफेन २३.५ प्रतिशत ई.सी (भार/भार) है यह धान (सीधी बुआई), चाय, आलू, प्याज और मूंगफली के मुख्य खरपतवारों की रोकथाम करता है।

उपयोग

फसल	खरपतवारों के नाम	प्रति हेक्टेअर मात्रा			अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनो में)
		स. तत्व	संरचना	पानी की मात्रा	
		(ग्रा.)	(मि.ली)	(ली.)	
धान (सीधी बुआई)	संवा, मोथा, भगंडा	१५०-२४०	६५०-१०००	५००	
चाय	मकरजुली, कोदो, सिरहु, मदनघंटी	१५०-२५०	६५०-१०००	५००-७५०	११
आलू	बथुआ, जंगली हालो, पथरचट्टा,हड्डासुरा,मोथा	१००-२००	४२५-८५०	५००-७५०	
प्याज	बथुआ, चौलाई (जगंली)	१००-२००	४२५-८५०	५००-७५०	
मूंगफली	सवां, मकरजुली	१००-२००	४२५-८५०	५००-७५०	

छिड़काव का समय
उगने से पूर्व रोपाई से ३-४ दिन के भीतर उपयोग करें।

उपयोग के लिये निर्देश
पौध सुरक्षा यंत्र : स्वेत की फसलो पर रीतिगत छिडकाव (अधिक मात्रा छिडकाव) के लिए पानी की मात्रा उपर दी गई है। साधारणतया प्रयोग में लाये जाने वाले स्पेयर है–बकेट पंप स्पेयर, स्टीरप पंप स्प्रेयर, नैपसैक स्पेयर, आदि। स्प्रेयर को फलड जेट या फलैट फैन नोजल के साथ प्रयोग करें नोजल का जमीन से एक ही उूचाई पर रखें। क्षेत्र पर छिडकाव सीधी लाईन में नियमित गति सें करें

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया
१. ऐसी स्थितयों में प्रयोग न करें जहाँ मधुमक्खियों, मछलियों, जीव जन्तुओं, जंगली पशु–पक्षियों के पहुंचने की संभावना हो।
२. मुँह, त्वचा व आंखो से दूर रखें।
३. हवा की दिश में स्प्रे करें।
४. स्प्रे के बाद कपड़ों व शरीर को अच्छी तरह से साफ करें।
५. स्प्रे करते समय धूम्रपान न करें व कुछ भी चबोय न खोय।
६. घोल बनाते समय रक्षात्मक कपड़ों का प्रयोग करें
७. खाने की वस्तुओं से दूर रखें।

विष के लक्षण
त्वचा, आंखो और श्वासनली में जलन ।

प्राथमिक चिकित्सा
काम करने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। सम्पर्क होने पर, त्वचा को साबुन पानी से अच्छी तरह धोएं। आंखो के लिए पानी से अच्छी तरह धोएं तथा चिकित्सक को दिखाएं

विष नाशक
थोडी मात्रा (१० मि.ग्रा./कि. ग्रा.). शरीर के भार से कम) ईलाज कें एक घंटा पहले की सर्वोत्तम चिकित्सा विधि इस प्रकार हैः १) एपीकॉक सिरप को १–२ गिलास पानी मे मिलाकर वयस्कों और १२ वर्ष से बड़े बच्चों के लिए दवा की मात्रा ३० मि.लि. व १२ वर्ष से बड़े बच्चों के लिए दवा की मात्रा १२ मि.लि. है। २) ३०–५० ग्राम सक्रिय चारकोल को नल के पानी मे स्लरी बनाकर, उल्टी रुक जाने के बाद दें। ३) सोडियम/मैगनिशियम सल्फेट ०.२५ ग्रा./कि.ग्रा. नल के पानी में कैथारीटिक के रूप मे दें। लक्षणानुसार चिकित्सा करें।

खाली डिब्बों का निपटारा
१. खाली डिब्बों को तोड कर आबादी से दूर गाढ़ दें।
२. खाली डिब्बों का पुनः प्रयोग रोकने के लिय उन्हें बाहर छोडें।
३. खाली डिब्बों, बचा हुआ सामान तथा मशीनों व डिब्बों का धोवन का सावधानीपूर्वक निपटारा करें जिससें जल व पर्यावरण दूषित न हो।

संग्रहण की शर्ते
१. खरपतवारनाशक के डिब्बों का संग्रहण अलग कमरे या स्थान पर, अन्य वस्तुओं विशेषकर खाद्य पदथों के संग्रहण कक्ष से दूर किया जाना चाहिए अथवा खरपतवार नाशक की मात्रा और स्वभाव पर निर्भर करते हुए डिब्बों को अलग अलमारी में ताला चाबी लगाकर करें।
२. खरपतवारनाशक का संग्रहण कक्ष या स्थान रोशनीदार, मजबूत, शुष्क, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौडाई का होना चहिये। जिसमें वाष्प द्वरा प्रदूषण ना हो ।

रासयनिक संरचना :

आक्सीफलोरफेन सक्रिय तत्व टैक्निकल	न्यूनतम शुद्धता ७० प्रतिशत,	३३.६००	%	भार/भार
इमुलसीफायरः कैलशियम अल्काईल एरिल सल्फोनेट पौलीआक्सी इथाइलीन ईथर		१०.२००	%	भार/भार
साइक्लो हैक्सेनोन		१३.४००	%	भार/भार
घोलक : जायलीन	पर्याप्त मात्रा	४२.८००	%	भार/भार
	योग :	**१००.००० %**		**भार/भार**

सावधान: इस निर्देश पत्रिका में निर्देशित ना किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करे.

उत्पादकः ऐन.ऐ.सी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(पूर्व में नागार्जुना अग्रिकेम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
प्लाट नं. १२-ए, सी ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स,नागार्जुना हिल्स,
पंजागुट्टा, हैदराबाद-५०० ०८२, तेलंगाणा, भारत
कर्मागार: ईतकोटा-५३३ २३८, तु.गो. जिल्ला, आंध्रप्रदेश.

ನಾರಿಲಾನ್

ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೆರ್‌ಫೆನ್ 23.5% ಇ.ಸಿ.(ಆ/ಆ)
(ಎಂಪಿಕ ಬೆಯಬಡೆನ ಕಲುಪುನಾಶಕ)

ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೆರ್‌ಫೆನ್ 23.5% ಇ.ಸಿ. ಎಂಪಿಕ ಬೆಯಬಡ್ಡ ಕಲುಪುನಾಶಕ ಇಂದು ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೆರ್‌ಫೆನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಮು 23.5 ಶಿಲೆಲೆ కలదు. ఇది వరి (పెదజల్లి విత్తన), తేయాకు, బంగాళదుంప, ఉల్లి మరియు వేరుశనగ పంటలలో నమ్మ ప్రధాన కలుపు మొక్కల్ని అరికట్టుటకై సిఫారసు చేయబడుతుంది.

సిఫారసులు :

పంటలు	కలుపుమొక్కల్ని సామాన్యంగా పిలిచే పేరు	పెర్బారుకు మోతాదు			మందు స్ప్రే నుండి కోత కాలం వరకూ వేచి వుండాల్సిన సమయం (రోజుల్లో)
		సం.మ. గ్రాములో	సూత్రీకరణ (మి.లీ.)	కరిగించుటకు నీరు (లీ)	
వరి(పెదజల్లిన) మొలకక ముందు	ఊడ నీటిరుంగ గుంటగిలిజేరు	150-240	650-1000	500	-
తేయాకు	వెంపలిమూర దీర్గగడ్డి, గాబుగడ్డి మదనబడడము	150-250	650-1000	500-750	15 రోజులు
వేరుశనగ	దొంగపరి వెంపలి మూర	100-200	425-850	500-750	
బంగాళదుంప	పప్పుకూర పేరంట కూర హిలియోట్రోపియం, గలిజేరు, బ్రహ్మకుంగ	100-200	425-850	500-750	
ఉల్లి	పప్పుకూర, విలకోట కూర	100-200	425-850	500-750	

వాడే సమయం : నారు నాటిన 3 4 రోజులలోపల, కలుపుమొక్కలు మొలకకముందు వాడాలి.

వాడుటకు సూచనలు సస్యరక్షణ పరికిరాలు : సాంప్రదాయక పిచికారి(హైవాల్యూం స్ప్రే) కోసం పైనివ్వబడిన నీటి పరిమాణాన్ని పంటను బట్టి తీసుకోవాలి. సాధారణంగా వాడబడే పిచికారీలు ఏమంటే, బక్కెట్ పంప్ స్ప్రేయర్, స్టిరప్ పంప్ స్ప్రేయర్, నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, వీల్ బర్రో స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ మొదలగునవి, పిచికారీ ఫ్లడ్‌జెట్ లేదా ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజల్ జతించాలి. నాజలను ఒక ఎత్తుల్లో అంటే గ్రౌండ్ లేవలకు ఫిక్స్ చేసి ఏకరీతి స్పీడ్‌లో తిన్నగా పాలమంతా పిచికారి చేయాలి.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ పంట సామాగ్రి మరియు పశువుల దాణాలకు, మేతకు దూరంగా దీన్ని వుంచండి. 2. దీన్ని నోటికి, చర్మానికి అంటకుండా, కళ్ళలో పడకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. 3. స్ప్రేదాడకపు పొగుమంచును పీల్చరాదు. పిచికారి గాలివాటం చూసుకొని పిచికారి చేసుకోవాలి. 4. కలుషితమైన బట్టల్ని, శరీరాన్ని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. 5. దీన్ని పిచికారి చేసుకొనేటప్పుడు ఏదైనా తినడం, పొగ పీల్చడం పొగాకు నములడం లాంటి పనులేమీ చేయరాదు. 6. మిశ్రమాన్ని కలుపుకునేటప్పుడు పూర్తిగా రక్షణ దుస్తుల్ని ధరించాలి.

విషపుజ్ఞాలు : ప్రాథమికంగా చర్మం, కళ్ళకు చికాకు కలుగుతాయి మరియు శ్వాసించడంలో ఇబ్బంది కలుగవచ్చును.

ప్రాథమిక చికిత్స :
చర్మం కలుషితమైనప్పుడు, సబ్బు మరియు నీళ్ళతో అధికంగా శుభ్రపర్చండి. కళ్ళకు తగిలిన ఎడల ఎప్పుడు నీటితో కళ్ళలోని దుమ్ము శుభ్రపర్చండి. వైద్య సహాయం పొందండి.

విషానికి విరుగుడు :
చిన్న చిన్న మోతాదులో (10 మి.గ్రా/ప్రతి కిలో శరీర బరువుకు) చికిత్సకు ఒక గంట సమయం కంటె తక్కువ సమయం లో ఇవ్వడం మంచిది.
1. సిరప్ యిపాకా సరిపడినంతంగా సెలికా సిరప్‌ను తీసుకొని 1నుండి 2 గ్లాసుల నీటితో కలిపి సర్వులు మరియు 12 సంవత్సరాల పిల్లలకు 30 మి.లి. ఇవ్వబడినది. 12 సం॥ లోపు పిల్లలకు 12 మి.లి.గు ఇవ్వబడినది.
2. నాలుకకు అగిన తరువాత ఉద్దేశిత తొగ్గు గంతికలను (స్పెక్టోబిన్ టాబ్‌లెట్‌లను) కలిపి 30 నుండి 50 గ్రాములను ఇవ్వబడినది.
3.సోడియం/ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ 0.25 గ్రా/ ప్రతి కిలో బరువుకు ఇవ్వబడినది నీరోనివారణగా ఇవ్వబడినది. విషజ్ఞాలకు అనుగుణంగా, తగిన విధంగా చికిత్స చేయబడినది.

భద్రపర్చడానికి సూచనలు :
1. కలుపు నాశిని ప్యాకెజీలు, దబ్బాలను పేరుగా/గీరుప్రాంతాల గదులలో నిలువచేయరదెను. నిలువ చేయు గదులు /ప్రాంతాలలో ముఖ్యంగా తేయ పదార్థాలతో కలిపి పుంచరాదు. కలుపు నాశినులను ద్రవ్యత్రీతిని ఆల్మారాలో ప్యాకెజీల పరియాలం మరియు నాచే గుణగణాలను దృష్టిలో పుంచుకొని తాళం వేసి జాగ్రత్తపర్చవలెను.
2. నిలువచేయు కలుపు నాశిని ప్యాకెజీలను, సరియైన పాదపు విదుల్లోనే, చీడలంగా కట్టిన గదులలో. ఫారాలమైన పెంపకము, గాలి, నీరోటబట్టుగాను, పాడెగాను, చల్లగాను పుండేటట్లుగాను, కలుషిత వాయువు బయటకు వెళ్ళుటకు కారణమేన కిటికీలను ఏర్పాటు చేయవలసినది.

రసాయనిక మిశ్రమం :

ఆక్సిఫ్లెరొఫెన్ టెక్నికల్ (కనీస శుద్ధత 70% బ/బ)	33.600 % బ/బ
ఎమల్సిఫైర్లు : కాల్షియం ఆల్కైల్ ఆరైల్ సల్ఫోనిక్	10.200 % బ/బ
ఆక్సైడ్ సర్ఫాక్టేడ్ పాలిఆక్సి ఇథైలీన్ ఈథర్ సైక్లోహెక్సానోన్	13.400 % బ/బ
ద్రావకం-జైలీన్ మ్యూనిస్ ఆఫ్ ఆయారికి తగినంత	42.800 % బ/బ
మొత్తం	100.000 % బ/బ

జాగ్రత్తలు: ఈ కరపత్రం పై వున్న పంటలు కాకుండా ఇతర పంటల మీద వాడరాదు.

తయారు చేయువారు : ఎన్.ఎ.సి.ఎల్. ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్
(పూర్వపు నాగార్జున అగ్రికెమ్ లిమిటెడ్)
ప్లాట్ నం. 12-ఎ, సి బ్లాక్, లక్ష్మీటవర్స్, నాగార్జున హిల్స్, పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్-500 082,
తెలంగాణ, భారతదేశం , ఫ్యాక్టరీ: ఈతకోట-533 238, తూ.గో. జిల్లా , ఆంధ్రప్రదేశ్.

ਨੈਰੀਲਾਨ

ਆਕਸੀਫਲੋਰਫੇਨ 23.5% ਈ.ਸੀ.
(ਚੁਣਨ ਯੋਗ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ)

ਆਕਸੀਫਲੋਰਫੇਨ 23.5% ਈ. ਸੀ ਭਾਰ/ਭਾਰ ਚੋਣਵਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਇਕ ਆਕਸੀਫਲੋਰਫੇਨ ਸਕ੍ਰਿਯ ਤੱਤ ਆਕਸੀਫਲੋਰਫੇਨ 23.5% ਈ ਸੀ ਚੋਣਵਾਂ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੇਲ (ਖੀਜ), ਚਾਹ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਪਯੋਗ

ਫਸਲ/ਫਸਲਾਂ	ਘਾਹ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਦੋ ਆਈ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਮਿਲੀ)	ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣਾ (ਲੀਟਰ)	ਫਸਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਅੰਤਮ ਸਪ੍ਰੇ ਦਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ ਵਿਚ)
		ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ			
ਪੁਰਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਲ (ਸੀਧਾ ਦਿਖਾਇਆ)	ਇਚੀਨੋਚੋਵਾ ਐਸ ਪੀ ਪੀ ਸਾਇਪਰਸ ਇਰੀਆ ਅੰਕਲੀਪਟਾ ਅਲਬਾ	150-240	650-1000	500	
ਚਾਹ	ਡੋਗੋਨਟਾਰੀਆ, ਇਮਪਰਟਾ ਪਾਸਪਾਲਮ ਹਿਸਪੀਡਾ	150-250	650-1000	500-750	15 ਦਿਨ
ਮੂੰਗਫਲੀ	ਅੰਕਲੀਪਟਾ ਕੇਲੋਨਮ ਡਿਜੀਟਾਰੀਆ ਅਰਜੀਨਾਟਾ	100-200	425-850	500-750	
ਆਲੂ	ਚਿਨੋਪੋਡੀਅਮ, ਕੋਰੋਨੋਪਸ, ਹੇਲੀਓਟ੍ਰਾਪੀਅਮ, ਟ੍ਰੀਐਨਥੀਮਾ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ	100-200	425-850	500-750	
ਪਿਆਜ	ਚਿਨੋਪੋਡੀਅਮ, ਅਮਾਰਨਥਸ ਵੀਰੀਡੀਸ	100-200	425-850	500-750	

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਉਗਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੋਧ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
ਪੋਧਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਪ੍ਰੇ ਲਈ (ਉੱਚ ਵਾਲਿਊਮ ਸਪ੍ਰੇ) ਉਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸੁਝਾਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਕੇਟ ਪੰਪ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਸਟਿਰਅੱਪ ਪੰਪ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਵਹੀਲ-ਬਰੋਇ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫਲੱਡ ਜੇਟ ਯਾ ਫਲੇਟ ਫੈਨ ਨੋਜਲ ਨਾਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਨੋਜਲ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਚਿਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਖੋ। ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਪੀਡ ਤੇ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਸਿਧਾ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰੋ।

ਪੂਰਵ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :
1. ਭੋਜਨ, ਖਾਲੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖੋ ।
2. ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਜਦੀਕ ਨਾ ਲਾਓ ।
3. ਸਪ੍ਰੇ ਦੀ ਧੁੰਧ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ । ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰੋ।
4. ਸਪ੍ਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੰਦਿ ਕੱਪੜੇਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ।
5. ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੀਓ, ਖਾਓ ਅਤੇ ਚਬਾਓ ।
6. ਘੋਲ ਜਾਂ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਪੂਰੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਣੋ ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਚੰਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ, ਸਾਂਹ ਦੀ ਨਲੀ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤੀ ਜਲਨ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਪਚਾਰ
ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਬਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰ ਦਵਾਈ (ਐਂਟੀਡੋਟ)

ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ (10 ਮਿ ਗ੍ਰਾ / ਕੇ ਗ੍ਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਨਿਗਲ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਵੇਗਾ:
1) 1-2 ਗਿਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ (1) ਟੋਪੀਕਾਕ ਦਾ ਸੀਰਪ। ਪੌੜ੍ਹ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ 30 ਐਮ ਐਲ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ 12 ਐਮ ਐਲ ਹੈ।
11) ਉਲਟੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਐਕਟੀਵੇਟੀਡ ਚਾਰਕੋਲ ਐਮੀਨੀਸਟਰ 30-50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਲਰੀ ਵਾਂਗ।
111) ਸੋਡੀਅਮ/ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ ਸਲਫੇਟ 0.25 ਗ੍ਰਾਮ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ. ਕੈਥਾਰਟਿਕ ਇਲਾਜ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ।
ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ :

1. ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।
2. ਪੈਕਜ਼ ਤੇਡ਼ ਦੇਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
3. ਪੈਕਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸੀਨ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਿਹਾਜ਼ਤ ਕਰ

നൈരീലന

ഓക്സിഫ്ലോറഫെൻ 23.5% ഇ.സി.
(തെരഞ്ഞെടുത്ത കളനാശിനി)

ഓക്സിഫ്ലൂറോഫെൻ സജീവ ഘടകം 23.5 % അടങ്ങിയ ഉത്തമമായ കളനാശിനിയാണ് ഓക്സിഫ്ലൂറോഫെൻ 23.5 %. നെല്ല് (നേരിട്ട് വിതച്ചത്), തേയില, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഉള്ളി, നിലക്കടല എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിളകളിലെ സൂപ്രധാന കളകളെ ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്:

ഒരു ഹെക്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അളവ്				അവസാന വിളവെടുപ്പു വരെയുള്ള കാത്തിരിക്കൽ കാലഘട്ടം (ദിവസത്തിൽ)
വിള (വിളകൾ) നാമം	കളയുടെ പൊതുവായ	എ. ഐ	രൂപവൽക്കരണം നേർപ്പിക്കൽ സ്പ്രേ മുതൽ	
		(ഗ്രാം)	(മില്ലി)	(ലിറ്ററിൽ)
നെല്ല് (നേരിട്ട് തളിക്കണം) മുളയ്ക്കും മുമ്പ്	എക്കിനോക്കൊള എസ് പി പി സൈപ്രസ് ഐറിയ എക്കിപ്റ്റ ആൽബ	150-240	650-1000	500
തേയില	ഡോഗെറ്റാരിയ, ഇംപെറ്റാറ പാസ്പലം, ബോറിയ ഹിസ്പിഡ	150-250	650-1000	500-750	15 days
നിലക്കടല	എക്കിനോക്കൊള കൊളോണം, ഡിജിറ്റാരിയ അർജിനാറ	100-200	425-850	500-750	
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്	കീനോപൊഡിയം, കോറോണോപസ്, ഹാലിയോട്രോപ്പിയം, ട്രിയാന്തേമ, സൈപ്രസ്	100-200	425-850	500-750	
ഉള്ളി	കീനോപൊഡിയം, അമാരാന്തസ് വിഡിഡിസ്	100-200	425-850	500-750	

തളിക്കേണ്ട സമയം:
മുളച്ചു പൊന്തും മുമ്പ് തളിക്കണം. പറിച്ച് നട്ട/നട്ട് 3-4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കണം.

വിള സംരക്ഷണ ഉപകരണം: പരമ്പരാഗത സ്പ്രേയ്ക്ക് (ഉയർന്ന വോള്യം സ്പ്രേയ്ക്ക്). പാടങ്ങളിലെ വിളകൾക്ക് മുകളിൽ ശുപാർശ ചെയ്ത അളവ് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണം. ബക്കറ്റ് പമ്പ് സ്പ്രേയർ, സ്റ്റിറപ്പ് പമ്പ് സ്പ്രേയർ, നാപ്സാക് സ്പ്രേയർ, വീൽ-ബാരോക്കൺ സ്പ്രേയർ, കംപ്രഷൻ നാപ്സാക് സ്പ്രേയർ എന്നിവയാണ് സർവ സാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്രേയർ. ഫ്ലഡ് ജെറ്റ് നോസിൽ കൊണ്ടായിരിക്കണം. ഈ സ്പ്രേയറുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. തറ നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ നോസിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഉയരത്തിൽ വയ്ക്കണം. തുല്യമായ വേഗത്തിൽ ഒരുവായി ഓരോ പ്രദേശത്തും തളിക്കണം.

മുൻകരുതലുകൾ:
1. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, ഒഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളുടെ കണ്ടെയ്നറുകൾ, മൃഗഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാറ്റി സൂക്ഷിക്കുക.
2. വായ്, കണ്ണുകൾ, ചർമ്മം എന്നിവയുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക.
3. തളിക്കുന്ന കണങ്ങൾ ശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാറ്റിന്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് തളിക്കുക
4. തളിച്ച ശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീര ഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക.
5. തളിക്കുന്ന വേളയിൽ പുകവലിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കുകയോ കഴിക്കുകയോ ചവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്
6.കുട്ടികൾക്കിത്തുമ്പോഴും തളിക്കുമ്പോഴും സമ്പൂർണ്ണ സംരക്ഷണ വസ്ത്രം ധരിക്കുക.

വിഷമേറ്റതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ:
ചർമ്മം, കണ്ണുകൾ, ശ്വാസകോശ നാളി എന്നിവയിൽ പ്രാഥമികമായുള്ള അസ്വസ്ഥത.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ
കൈകാര്യം ചെയ്ത ശേഷം നന്നായി കഴുകുക. ചർമ്മത്തിലോ കൈകളിലോ പുറമുകയാണെങ്കിൽ, ധാരാളം വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക. കണ്ണുകളിൽ പുറണ്ടാൽ ധാരാളം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുക. മെഡിക്കൽ ശ്രുശ്രൂഷ തേടുക.

വിഷമേറ്റാൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്:
ഒരു ചെറിയ അളവ് (മാന്തം ശരീരഭാരത്തിന്റെ കിലോഗ്രാമിന് 10 മിഗ്രാമിൽ കുറവ്) ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ കുറവ് സമയം കൊണ്ട് നൽകേണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ:
i) Syrup of I peacac ന്റെ തുടർന്ന് 1-2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നൽകുക. മുതിർന്നവർക്കും 12 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും നൽകേണ്ടത് 30 മില്ലി. 12 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടത് 12 മില്ലി.
ii) ചാർട്ടി നിന്ന ശേഷം പൈപ്പ് വെള്ളത്തിൽ 30-50 ഗ്രാം, സജീവ ചാർക്കോൾ നൽകുക
iii) സോഡിയം/മഗ്നീഷ്യം, സൾഫേറ്റ് 0.25 ഗ്രാം.കി.ഗ്രാം പൈപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാനായി നൽകുക. ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ചികിത്സിക്കുക.

ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിക്കൽ:
1.ഉപയോഗിച്ച പായ്ക്കേജുകൾ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയരുത്. അവയുടെ പുനരുപയോഗം തടയണം.
2.ഈ പായ്ക്കേജ് പൊട്ടിച്ച് മനുഷ്യവാസ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കുഴിച്ചിടണം.
3.പായ്ക്കേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി വന്ന വസ്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കൽ, സ്പ്രേ ഉപകരണങ്ങൾ കഴുകൽ എന്നിവ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കണം. അങ്ങനെ പരിസ്ഥിതിയും ജലവും മലിനപ്പെടുന്നത് തടയണം.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ:
1.ഈ പായ്ക്കേജിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കളനാശിനി മറ്റ് സാധനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും മൃഗങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു മാറിയുള്ള പ്രത്യേക മുറികളിലോ സ്ഥലങ്ങളിലോ വേണം കള നാശിനിയുടെ സ്വഭാവവും അളവും അനുസരിച്ച് അലമാരയിൽ പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്.
2.ഈ കളനാശിനി സൂക്ഷിക്കാനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മുറി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം നല്ല കെട്ടുറപ്പുള്ളതും ഈർപ്പം ഇല്ലാത്തതും തണുപ്പുള്ളതും നല്ല വായു സഞ്ചാരം ഉള്ളതും ബാഷ്പീകരണത്തിലൂടെയുള്ള മാലിന്യം ഒഴിവാക്കാൻ നല്ല വിസ്താരിണ. ഉള്ളതും ആയിരിക്കണം.

രാസ സംയുക്തം:

ഓക്സിഫ്ലൂറോഫെ ടെക് (പുരുഞ്ഞിയ പരിശുദ്ധി 70 % ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു)	33.600 % ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു
എമൽസിഫൈയർ: കാൽസ്യം ആൽക്കൈൽ ആരൈൽ സൾഫോണിക് പോളിഓക്സി എത്തിലീൻ ഈതർ	10.200 % ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു
സൈക്ലോഹെക്സാനൺ	13.400 % ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു
സോൾവന്റ്: സൈലീൻ	42.800 % ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു
ആകെ:	**100.000 %** ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു

നിർമ്മാതാക്കൾ : നാഗാർജുനാ ആഗ്രികെമ് ലി.
പ്ലാട നം. 12 എ, സി. ബ്ലാക, ലക്ഷ്മിടവസ് നാഗാജുനാ ഹില്ല, പുന്ജാഗുട്ടാ
ഹൈദരാബാദ-500 082, എ.പി. ഇംഡിയാ ഫാക്ടറി: ഐത്തകോടാ- 533238. എ.പി. ഇംഡിയാ
കസ്റ്റുയുമർ കെർ സെല് - എക്ലിക്യുടിവ ഫോന്
ഫ്ലാഡഡഫ : ഭടധഫണളപലസലഃഭടധടറനഴഭടടഥറധഡദണബ.ഡമബ

ನಾರಿಲಾನ

ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೋರ್‌ಫೆನ್ 23.5% ಇಸಿ
(ಆಯ್ದ ಕಳೆನಾಶಕ)

ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೋರ್‌ಫೆನ್ 23.5% ಇಸಿ. ಒಂದು ಆಯ್ದ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೋರ್‌ಫೆನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶ 23.5% ಹೊಂದಿದ ಭತ್ತ (ನೇರ ಬೀಜ), ಟೀ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಿಫಾರಸ್ಸು :

ಬೆಳೆಗಳು	ಕಳೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಡೊಸ್			
		ಎ.ಐ.	ಸಂರಚನೆ	ದುರ್ಬಲತೆ	ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ
		ಗಾಂ	(ಮಿ.ಲಿ.)	ಲೀಟರ್	ಕಟಾವಿನ ವರೆಗೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
ಭತ್ತ	ಕಿನೋಕ್ಲೋವ ಸ್ಪೆಪರಸ್ ಇರಿಯ ವಿಕ್ಟಿಪ್ಪ ಆಲ್ಬ	150-240	650-1000	500	
ಟೀ	ಡೊಗೊಟರಿಯ, ಇಂಪರೆಟ್ ಪಾಸ್ಪಲಂ, ಬೋರೇರಿಯಾ ಹಿಸ್ಪಿಡಿಯ	150-250	650-1000	500-750	15
ಕಡಲೆಕಾಯಿ	ಕಿನೋಕ್ಲೋವ ಕೊಲೋನಂ ಡಿಜಿಟೆರಿಯಾ ಆರ್ಗಿನಾಟ	100-200	425-850	500-750	
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ಚೆನೋಪೋಡಿಯಂ ಕೊರೊನೋಪಸ್ ಹ್ಯಾಲಿಯೋಟ್ರೊಪಿಯಮ್ ಟ್ರೈಯಾಂಥೆಮ್, ಸೈಪೆರಸ್	100-200	425-850	500-750	
ಈರುಳ್ಳಿ	ಚೆನೋಪೋಡಿಯಂ ಅಮರಾಂಥಸ್ ವಿಡಿಡಿಸ್	100-200	425-850	500-750	

ನಾಟುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಡಿದ/ನೆಟ್ಟ ದಿನದಿಂದ 3-4 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.
ಗಿಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಉಪಕರಣ :- ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ (ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪಡಣೆ). ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಶಿಫಾರಸಿಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳೆಂದರೆ, ಬಕೆಟ್, ಪಂಪ್ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಸ್ಟಿರ್ರಪ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ವೀಲ್ ಬರೋಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್ಸಾಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಸ್ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್ ನಾಜಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ ನಾಜಲನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಳಿವಡಿಸಿ. ನೇರ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು :-
1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಶೇಖರಣೆ ಡಬ್ಬಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ.
2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
3. ಸಿಂಪಡಣೆ ಸಿಂಚನವನ್ನು ಒಳಗೆಳುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
4. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಲುಷಿತವಾದ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
5. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಏನನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ.
6. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ.

ವಿಷವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು :-
ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :-
ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಗೂ ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರತಿವಿಷ :-
ವಿಷವಾದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದರೆ (ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ. ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೂ 10 ಮಿ. ಗ್ರಾಂ.ನಂತೆ)

ಈ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು :-
1. 1 ಪೀಕ್ಯಾಕ್ ಸಿರಪ್ ಬಳಿಕ 1-2 ಲೋಟ ನೀರು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 30 ಮಿ.ಲೀ. 12 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 12 ಮಿ.ಲೀ..

2. ಸಕ್ರೀಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ವಾಂತಿ ನಿಂತ ಬಳಿಕ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 30-50 ಗ್ರಾಂ ಬೆರೆಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಸಿ.

3. ಕ್ಯಾರ್ಥಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ 0.25 ಗ್ರಾಂ/ಕೆ.ಜಿ. ಸೋಡಿಯಂ/ಮ್ಯಾಗ್ನೀಶಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ರೋಗಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಡಬ್ಬಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ :-
1. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬಾರದು.
2. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ಜನ-ಪ್ರಾಣಿವಾಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉಳಿದು ಹೋದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು, ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದ ಹಾಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಶೇಖರಣೆ ವಿಧಾನ :-
1. ಶಿಲಿಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ/ಕೋಣೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಶೇಖರಿಸಬೆಕು.
2. ಶಿಲಿಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಕೋಣೆ/ಆವರಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಒಣಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಆಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಧೂಮ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾಗದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂರಚನೆ :-

ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೋರ್‌ಫೆನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಶುದ್ಧತೆ 70%	33.600%
ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ : ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಪಾಲಿ ಆಕ್ಸಿ ಎಥೈಲೀನ್ ಈಥರ್	10.200%
ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸಾನೋನ್	13.400%
ದ್ರಾವಕ :ಕ್ಸೈಲೀನ್	42.800%
ಒಟ್ಟು	100.00%

ಜಾಗ್ರತೆ: ಈ ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.

ಉತ್ಪಾದಕರು : **ಎನ್‌ಎಸಿಎಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್**
(ಈ ಹಿಂದೆ 'ನಾಗಾರ್ಜುನ ಆಗ್ರಿಕೆಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು)
ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.12-ಎ, ''ಸಿ'' ಬ್ಲಾಕ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟವರ್ಸ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹಿಲ್ಸ್, ಪಂಜಗುಟ್ಟ, ಹೈದಾರಾಬಾದ್-500 082, ತೆಲಂಗಾಣ, ಭಾರತ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಎಥಕೋಟ - 533 238, ಈಸ್ಟ್ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಭಾರತ.

NARILON

Oxyfluorfen 23.5% E.C
(Selective Herbicide)

Oxyfluorfen 23.5% E.C. is selective herbicide containing Oxyfluorfen active ingredient 23.5% E.C. It controls important weeds in crops like Rice (Direct seeded), Tea, Potato, Onion and Groundnut.
Recommendation

Crop(s)	Common Name of Weeds	Dosage / Ha			Waiting Period in days from last spray to harvest
		A.1 (gm)	Formulation (ml)	Dilution in (Litr)	
Rice(Direct shown) as pre-emergence	Echinochloa Spp. Cyperus iria Eclipta alba	150-240	650-1000	500	
Tea	Digitaria, Imperata, Paspalum, Borreria hispida	150-250	650-1000	500-750	15days
Groundnut	Echinochloa colonum Digitaria arginata	100-200	425-850	500-750	
Potato	Chenopodium, Coronopus, Haliotropium, Trianthema, Cyperus	100-200	425-850	500-750	
Onion	Chenopodium, Amaranthus vididis	100-200	425-850	500-750	

Time of Application

Pre emergence application. Use with in 3-4 days from transplanting/plantation.

Direction Of Use

PLANT PROTECTION EQUIPMENTS : For conventional spray (High Volume spray). On field crop quantity of water is recommended above. The most commonly used sprayer are Bucket pump sprayer, Stirrup pump sprayer, Knapscak sprayer, wheel-barroe sprayer, compression knapscak sprayer etc. Use the sprayer with flood jet or flat fan nozzle. Keep the nozzle at fixed height from the ground level. Spray the area in straight line at uniform speed.

Precaution
1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning
Primary irritation to skin, eyes and respiratory tract.

FirstAid
Wash thoroughly after handling. In case of contact, wash skin with plenty of water and soap. For eyes, flush with plenty of water. Get medical attention.

Antidote
Ingestion of small amounts (less than 10mg/kg body weight) occurring less than an hour before treatment are best treated by: i) Syrup of Ipecac followed by 1-2 glasses of water. Dose for adults and children above 12 years 30ml.Dose for children under 12 years 12 ml. ii) Activated charcoal administer 30-50 gm as slurry in tap water after vomiting stops. iii) Sodium/Magnesium sulphate 0.25 gm/kg. in tap water as a cathartic. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container
1. Used package shall not be left out side to prevent their reuse.
2. The packages shall be broken and burried away from habitation.
3. Packages or surplus materials and washings of the spray equipments should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Storage Conditions
1. The package containing the herbicides shall be stored in separate rooms or premises away from the room or permises used for storing other articles, particularly food and animal feed or herbicide must be stored in separate almiriah under lock and key, depending upon the quantity and nature of the herbicide.
2. The room or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry cool, well ventilated and of sufficient dimensions to avoid vapour contamination.

Chemical Composition:

OxyfluorfenTech. (Min.purity70% w/w)	33.600 % w/w
Emulsifiers: Calcium alkyl aryl sulphonate polyoxy ethylene ether	10.200 % w/w
Cyclohexanone	13.400 % w/w
Solvent: Xylene Q.S	42.800 % w/w
Total:	100.000 % w/w

CAUTION : Not to be used on crops other than specified on this leaflet

Manufactured by : NACL Industries Limited
(formerly known as 'Nagarjuna Agrichem Limited')
Regd.Off.: Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta,Hyderabad - 500 082, Telangana, India.
Factory: Ethakota-533 238, E.G. Dist., A.P.

অক্সিফ্লুরফেন

অক্সিফ্লুরফেন ২৩.৫% ইসি
কীটনাশক আগাছানাশক

অক্সিফ্লুওরফেন ২৩.৫% ই.সি. নির্দেশিত হার্বিসাইডে কার্যকরী অক্সিফ্লুওরফেন উপাদান ২৩.৫% ই.সি. অন্তর্ভুক্ত। এটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল যেমন চাল, (প্রত্যক্ষ বীজ), চা, আলু, পেঁয়াজ এবং বাদামের আগাছা নিয়ন্ত্রণ করে।
সুপারিশ:

শস্য	আগাছার সাধারণ নাম	এ.আই	সূত্র	দ্রবণীয়	শেষোক্ত স্প্রে থেকে গোলাজাতর মধ্যবর্তী
		(গ্রাম)	(মিলি)	(লিটার)	
অপেক্ষায়মান সময় পূর্ব-নির্গমন চাল (প্রত্যক্ষ নির্দেশিত)	(দিনগুলি) ইচিনোচলোয়া এসপিপি সাইপেরাস ইরিয়া ইকলিপটা অ্যালবা	১৫০-২৪০	৬৫০-১০০০	৫০০	
চা	ডোগোটারিয়া, ইম্পেরাটা পাসপালাম, বোরেরিয়া হিসপিডা	১৫০-২৫০	৬৫০-১০০০	৫০০-৭৫০	১৫ দিন
বাদাম	ইচিনোচোলা কোলোনাম, ডিজিটারিয়া আর্জিনাটা	১০০-২০০	৪২৫-৮৫০	৫০০-৭৫০	
আলু	চেনোপোডিয়াময, কোরোনোপাস, হালিওট্রোপিয়াম, ট্রিয়ানথেমা, সাইপেরাস	১০০-২০০	৪২৫-৮৫০	৫০০-৭৫০	
পেঁয়াজ	চেনোপোডিয়াম, আমারানথাস বিডিডিস	১০০-২০০	৪২৫-৮৫০	৫০০-৭৫০	

প্রয়োগের সময়:
পূর্ব নির্গমনপ্রয়োগ। চারা রোপনস্বসানোর থেকে ৩-৪ দিনের মধ্যে।
চারা সুরক্ষার যন্ত্রপাতি : রীতিগত স্প্রের জন্য (উচ্চ পরিমাণ স্প্রে)। মাঠে শস্যে জলের পরিমাণ উপরে নির্দেশিত। সর্বাধিক ব্যবহৃত স্প্রেয়ারগুলি হল বাকেট পাম্প স্প্রেয়ার, স্টিরাপ পাম্প স্প্রেয়ার, ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, হুইল-ব্যারো স্প্রেয়ার, কমপ্রেসান ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, স্প্রেয়ার জলের ফোয়ারার নজলের সঙ্গে ব্যবহার করুন। নজল মাটির তলদেশের মাত্রার থেকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় রাখুন। অবিচল গতিতে সরলরেখায় জায়গাটা স্প্রে করুন।
সাবধানতা:
১.খাদ্যবস্তুর থেকে দূরে রাখুন, খাদ্য বস্তুর পাত্র এবং প্রাণীর খাদ্য খালি রাখুন।
২.মুখ, চোখ এবং চামড়ার সঙ্গে যোগাযোগ পরিত্যাগ করুন।
৩.কুয়াশাতে স্প্রের সময় নিঃশ্বাস নেওয়া পরিত্যাগ করুন। বাতাসের দিকে স্প্রে করুন।
৪.স্প্রের পর পরিহিত জামাকাপড় এবং শরীরের অংশ ভালভাবে জলে পরিষ্কার করুন।
৫.যখন স্প্রে চলবে, কোনকিছু ধূমপান, পান করা, খাওয়া বা চেবানো করবেন না।
৬.যখন মিশ্রণ এবং স্প্রে করবেন, পূর্ণ সুরক্ষার জামাকাপড় পরিধান করবেন।
বিষাওের লক্ষণগুলি:
ত্বক, চক্ষু এবং শ্বসনযন্ত্রের অংশে প্রাথমিক অসহ্যতা
প্রাথমিক চিকিৎসা:
হস্তান্তরের পর ভালভাবে জল দিয়ে ধুয়ে নিন। সংস্পর্শের ঘটনা ঘটলে, ত্বকপ্রচুর পরিমাণ জল এবং সাবান দিয়ে ধুয়ে নিন। চোখের জন্য,প্রচুর জল দিয়ে পরিষ্কার করুন। ঔষধীয় চিকিৎসা নিন।
প্রতিষেধক দ্রব্য :
চিকিৎসার পূর্বে এক ঘণ্টার কমে ক্ষুদ্র পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা (১০ মিগ্রার কমশরীরের ওজনের প্রতি কিগ্রাতে) সর্বোত্তম চিকিৎসার দ্বারা:
১.১ পিক্যাক সিরাপ নির্দেশিত ১-২ গ্লাস জলে। ১২ বৎসরের উর্দ্ধে বড় এবং শিশুদের জন্য মাত্রা হল ৩০ মিলি। ১২ বৎসরের নিচে শিশুদের জন্য মাত্রা হল ১২ মিলি।
২.বমি থামবার পর কার্যকরী চ্যারকোল এমিনিস্টার কলের জলে ৩০-৫০ গ্রাম স্লারি রূপে।
৩.ক্যাথারটিক রূপে কলের জলে সোডিয়াম্ম্যাগনেসিয়াম সাফেট প্রতি কিগ্রাতে ০.২৫ গ্রাম। লক্ষণগুলি চিকিৎসা হয়।
ব্যবহৃত পাত্রের হস্তান্তর:
১.ব্যবহৃত বাক্সগুলি তাদের পুর্ন-ব্যবহারেপ্রতিরোধে বাহিরে ফেলা উচিত নয়।
২.বাসস্থানের থেকে অনেক দূরে ব