

English

OSCAR

Azoxystrobin 120 g/L + Tebuconazole 240 g/L SC (Systemic Fungicide) (For Agricultural Use)

Azoxystrobin 120 g/L + Tebuconazole 240 g/L SC is a suspensible concentrate fungicide for control of Fruit rot & Dieback (Colletotrichum capsici) and Powdery mildew (Leveillula taurica) in chilli and Blast (Pyricularia oryzae) and Sheath blight (Rhizoctonia solani) in Rice crop.

Crops(s)	Common name of diseases	Dosageper hectare			Waiting period between last spray and harvest (in days)
		a.i. (gms)	Formulation (ml)	Dilution in water (Lt)	
Rice	Blast and Sheath blight	249	830	500	24 days
Chilli	Fruit rot, Dieback and Powdery mildew	249	830	500	7 days

Direction of use: Take the measured quantity of fungicide and add to it a small quantity of water. Stir thoroughly using a stick or rod and then add remaining quantity of water, stir well to from final spray solution.

Weather conditions in general: Do not apply when weather conditions favour drift from treated areas.

Soil and Water: Not available
Crop stage for application: Azoxystrobin 120g/L+ Tebuconazole 240 g/L SC is applied with knapsack sprayer at early appearance of diseases.

Application Techniques: Take the measured quantity of fungicide and add to it a small quantity of water. Stir thoroughly using a stick or rod and then add remaining quantity of water, stir well to form final spray solution.

Equipment Type: Applied with knapsack sprayer.

Nozzle type : Hallow cone nozzle

Dosage : As mentioned in above table
Instructions for mixing : Take the measured quantity of fungicide and add to it a small quantity of water. Stir thoroughly using a stick or rod and then add remaining quantity of water, stir well to form final spray solution.

Optimal re-entry period : 48 Hrs

Pre-harvest Interval : As mentioned in the above table

Application timings: Azoxystrobin 120 g/L + Tebuconazole 240 g/L SC is applied at early appearance of diseases.

Frequency including maximum number of Sprays: Three

Precautions: During spraying wear suitable respiratory equipment. Wear suitable protective clothing and chemical resistant boots. Wear suitable gloves. Wear chemical goggles or face shield. Do not chew tobacco, eat food or smoke while handling fungicide. Do not contaminate environment or discharge waste into environment etc.

Signs and Symptoms of Poisoning: Ataxia by oral and weakness, fatigue, dyspnoea, diarrhoea, abdominal pain, nasal discharge, hypo activity, tremors, hunched posture, abdominal breathing, piloerection, sedation, nausea vomiting and ruffled appearance if inhaled.

First Aid Measures:
Inhalation: Remove victim to fresh air. Keep victim warm and at rest. If breathing is difficult, give oxygen, obtain medical attention. Ingestion: Do not include vomiting. Wash out mouth with plenty of water. Rinse mouth before giving glass of water. Never give anything by mouth to an unconscious person. If breathing is difficult, give oxygen get medical attention. Skin Contact: Remove affected clothing and wash all exposed skin area with soap and water followed by warm water rinse. Consult a doctor in the event of any complaints. Eye contact: Wash off with plenty of water if pain persists, consult an eye specialist.

Phytotoxicity: Non phytotoxic when used as recommended.
Anti-Toxic: No specific antidote is known. Treat symptomatically

Storage:

- The packages containing the fungicides should be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicides.
- The rooms or premises meant for storing the fungicides shall be well built, dry, well-lit, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Disposal of Used containers:

- It shall be the duty of manufacturers/ formulators of pesticide and operator to dispose packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.
- The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
- Packages shall be broken and buried away from habitation.

Chemical Composition:	
Azoxystrobin a.i.	: 120.00 g/L
Tebuconazole a.i.	: 240.00 g/L
Magnesium aluminium silicate	: 5.00 g/L
Polyalkoxylated butyl ether	: 25.00 g/L
Methyl methacrylate graft copolymer	: 25.00 g/L
Dimethylpolysiloxane	: 5.00 g/L
1-2-Benzisothiazole - 3 -one	: 1.00 g/L
Propylene glycol	: 70.00 g/L
Xanthan Gum	: 2.00 g/L
Water	: Q.S
Total	: 1000.00 g/L

Caution: Product is toxic to birds, fish, aquatic organism and thus the product containing the molecule may be avoided near aquaculture. **Not to be used on crops other than recommended crops.**

Manufactured & Marketed by : NACL Industries Limited

Regd.Off.: Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India.
Factory: Ethakota-533 238, E.G. Dist., A.P.

Hindi

ऑस्कर

एजॉक्सीस्ट्रोबिन १२० ग्राम/लीटर + टेबुकोनाजोल २४० ग्राम/लीटर एस सी (अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक) (कृषि उपयोग के लिए)

एजॉक्सीस्ट्रोबिन १२० ग्राम/लीटर + टेबुकोनाजोल २४० ग्राम/लीटर एस सी मिर्व की फसल में फल गलन, डाई बिक और भयमी फफूंद व धान में सहसामाी और पण्डर अंगमारी रोग की रोकथाम हेतु असदार फफूंदनाशक है।

फसल	रोगों के सामान्य नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा			अलिय सी और फसल काटने के बीच प्रतीक्षा अवधि (दिनों में)
		स.त्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली.)	पाानी की मात्रा (लीटर)	
धान	सहसामरी और पर्णछंद अंगमारी	२४९	८३०	५००	२४
मिर्च	फल गलन, डाई बिक और भयमी फफूंद	२४९	८३०	५००	७

उपयोग के दिशानिर्देश:-
फफूंदनाशक की मापी हुई मात्रा लें और उसे थोड़े से पानी में मिलाएं। एक छड़ी या रॉड से अच्छी तरह हिलाएं। फिर पानी की शेष मात्रा मिलाकर अच्छी तरह हिलाते हुए धोलकर अंतिम छिड़काव चोल बना लें।

मौसम की स्थिति सामान्य रूप से:- जब मौसम की स्थिति इलाज क्षेत्रों से बहाव के पक्ष में हो लागू न करें।
मिट्टी और पानी:- उपलब्ध नहीं है
छिड़काव के लिए फसल की अवधि:- विमारी के प्रारंभिक लक्षण दिखने पर एजॉक्सीस्ट्रोबिन १२० ग्राम/लीटर + टेबुकोनाजोल २४० ग्राम/लीटर एस. सी। (स्नाय्न चोल) का उपयोग नैपसेक स्प्रेयर से करें।
छिड़काव की तकनीक:- फफूंदनाशक की मापी हुई मात्रा लें और उसे थोड़े से पानी में मिलाएं । एक छड़ी या रॉड से अच्छी तरह हिलाएं। फिर पानी की शेष मात्रा मिलाकर अच्छी तरह हिलाते हुए धोलकर अंतिम छिड़काव चोल बना लें।

उपकरण के. प्रकार:- नैपसेक स्प्रेयर
नोजल का प्रकार:- हैनो कोन नोजल
कीटनाशक की मात्रा:- जैसा कि उपर तालिका में उल्लेख किया गया है
इस्तेमाल के लिए निर्देश:- फफूंदनाशक की मापी हुई मात्रा लें और उसे थोड़ से पानी में मिलाएं। एक छड़ी या रॉड से अच्छी तरह हिलाएं । फिर पानी की शेष मात्रा मिलाकर अच्छी तरह हिलाते हुए धोलकर अंतिम छिड़काव चोल बना लें।
उपयुक्त पुनः प्रवेश अंतराल:-४८ घंटे

अंतिम छिड़काव और फसल की कटाई बीच अंतराल : जैसा कि उपर तालिका में उल्लेख किया गया है
छिड़काव का समय:- विमारी के प्रारंभिक लक्षण दिखने पर एजॉक्सीस्ट्रोबिन १२० ग्राम/लीटर + टेबुकोनाजोल २४० ग्राम/लीटर एस.सी. (स्नाय्न चोल) का उपयोग नैपसेक स्प्रेयर से करें।
छिड़काव की आवृत्ति अधिकतम छिड़काव समेत : - पंद्रह दिनों के अंतराल पर तीन छिड़काव सावधानियां

१ छिड़काव के दौरान उपयुक्त श्वसन उपकरण पहने।
२. उपयुक्त सुरक्षात्मक कपड़े और रासायनिक प्रतिरोधी जूते पहने ।
३. उपयुक्त दस्तान पहने ।
४. रासायनिक बर्तने या बेगर कवर पहने।
४. फफूंदनाशक को प्रयोग में लाते समय तय्याकू नहीं बचाए तथा साना-पीना बंद रखें।
५. पर्यावरण को दूषित न करें या करने को पर्यावरण आदि में न बहाएं।

विषाक्तता के लक्षण: मुंह और नाक निर्वहन द्वारा गतिभव होना, अवक्रिया, कंपकंपी, घबराहट होना, कमजोरी, थकान, दमा, अतिपार, कूबड़ मुड़ा, पेट की सांस लेना, पित्तोद्रेकेशन, बेहोशी, मतली उल्टी पेट दर्द अगर सांस द्वारा निगल लिया हो।

प्राथमिक उपचार के उपाय:
१. अगर सांस ब्रवास शरीर में चला गया हो तो रोगी को खुली हवा में ले जाएं। अगर सांस लेने में असुविधा हो रही हो तो ऑक्सीजन ल दें। शंक्कर को बुलाएं।
२. अगर निगल लिया गया हो तो उल्टी कराने की कोशिश न करें। पानी से मुई धो लें। पानी पिलाने से पहले मुंह को अच्छे से कुन्ना करें। बेहोश व्यक्ति को कभी मुंह से कुछ न दें। अगर सांस लेने में कुछ असुविधा हो रही तो ऑक्सीजन दें। शंक्कर को बुलायें।
३. अगर फफूंदनाशक ल्वा पर लग गया हो तो प्राभावित कपड़े निकालने और ल्वा को भयूर पानी से और साबुन से धोएं। टिकावत की घटना में चिकित्सक से परामर्श करें।
४. अंतिां से सम्पर्क होने से खूब पानी से धो लें। दर्द बरा रहे तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें।

विष-प्रतिकारक: कोई विशेष प्रतिविष नहीं। लक्षणो के अनुसार उपचार करें।
बीज-विषाक्तता : सुझावी गई मात्रा में इस्तेमाल किए जाने पर बीज विषयक नहीं।
भंडारण :
१. फफूंदनाशक के पैकेजों को उलग अलग कमरों या खादुव पदार्थ रखे जाने वाले कमरों से दूर अलग जगहो पर या अर्मीगो इस के प्रमाण व प्रकार के हिसाब से ताला बांधी बंद कर के रखना चाहिए।
२. संग्रह कक्ष अच्छी तरह से बना हो सूखा, हवादार, प्रकाशयुक्त व पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए। जिससे की भाप प्रदूषित न हो।

कंटेनरों का निराकरण :
१. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य हैं, कि डिब्बों या पात्रों को तीक्ष्णोत्तर आवेदी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।
२. प्रयोग किये गये डिब्बों को द्वारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोड़ें। डिब्बों या कवी हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आपसपास की बीजों, पानी बिथैला न हो।

रासायनिक संरचना :	
एजोऑक्सीस्ट्रोबिन सक्रिय तत्व	१२०.०० ग्राम/लीटर
टेबुकोनाजोल सक्रिय तत्व	२४०.०० ग्राम/लीटर
मैग्नीशियम एलुमिनियम सिलिकेट	५.०० ग्राम/लीटर
पॉली एल्कोस्राइनेटेड ब्यूटइल ईथर	२५.०० ग्राम/लीटर
मिथिल मेथाक्राइलेट ग्राफ्ट कोपोलिमर	२५.०० ग्राम/लीटर
डि मैथिलपोलीसिलोक्सैन	५.०० ग्राम/लीटर
१-२-बेन डिसोथियाजोल-३-वन	१.०० ग्राम/लीटर
प्रोपलीन ग्लाइकोल	७०.०० ग्राम/लीटर
जन धन गम	२.०० ग्राम/लीटर
पाानी	पर्याप्त मात्रा
कुल	१०००.०० ग्राम/लीटर

सावधानी: उत्पाद जलीय जीवों एवं पक्षियों के लिए विषाक्त है इसलिए जल निकायों, जलकृषि/मत्स्य पालन क्षेत्र के पास उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेवल / पंक्तिवार पर सस्फाइव की गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर प्रयोग न करें। खाली डिब्बों को इस्तेमाल करने के बाद तट कर दें।

उत्पाद और बिक्रेता द्वारा : ऐन.ऐ.सी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड
प्लांट नं. १२-ए, सी ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स, नगराजुना हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद-५०० ०८२, तेलंगाणा, भारत कर्मगार : ईतकोटा-५३३ २३८, तु.गो. जिल्ला, आंध्रप्रदेश.

Telugu

ఆస్కార్

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 120 గ్రా/లి + టెబుకొనాజోల్ 240 గ్రా/లి యస్. సి (అంతర్వాహిక శీలీంధ్రనాశిని) (వ్యవసాయ ఉపయోగం కోసం)

అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 120 గ్రా/లి + టెబుకొనాజోల్ 240 గ్రా/లి యస్. సి అనేది ఒక సస్పెండ్బుల్ గాఢ శీలీంధ్రనాశిని. ఇది వివిధలో వచ్చు కాలు కుళ్ళు, కొవ్వు ఎండు తెగులు (కోర్లెట్టెడను కాస్టన్స్), బూడిద తెగులు (టేపెఇల్లూరా టౌంట్) మరియు పరిశీ వచ్చు అగ్ని తెగులు (ఫైరిక్యాకేరియా ఒర్లైజా), పొడ తెగులను (రైజోక్టోనియా సొని) నియంత్రించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.

పంట(లు)	తెగులు పోషకాద్య పేరు	మోతాదు / హెక్టారుకు		కలపవలసిన పిల్చు	పంట పండిత సమయంలోఉత్పత్తి చేసే ఉపయోగపడే పంటలు
		ఎ. ఐ (గ్రా)	మూత్రదళన (మి. లి)		
పరి	అగ్నితెగులు మరియు పొడ తెగులు	249	830	500	24 రోజులు
మిరప	కాలు కుళ్ళు, కొవ్వు ఎండు తెగులు బూడిద తెగులు	249	830	500	7 రోజులు

ఉపయోగించేందుకు సూచనలు : శీలీంధ్రనాశిని యొక్క కొలిపిన పరిమార్చాన్ని తీసుకొని దానికి కొద్ది మొత్తంలో పిండి జోడించండి. కర్ర లేదా రాచిని ఉపయోగించి బాగా కలిపి, అన్ని వివిధాల పిండి జోడించి, చివరి స్ట్రీ డ్రావలం పిచ్చిదా బాగా కలపండి.

పాధాలను వాడాలను పరిస్థితులు: వాతావరణ పరిస్థితులు చికిత్స చేయబడిన ప్రాంతం నుండి ట్రైన్లకు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు దీనిని ఉపయోగించవచ్చు.
చేప మరియు పీచు నిర్జల సమూహం లేదు.
ఉపయోగించవలసిన పంట పేజ : అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 120 గ్రా/లి + టెబుకొనాజోల్ 240 గ్రా/లి యస్. సి ను తెగులు ముందటి చక్కలో నాన్ల సాఫ్ట్ స్ప్రేయర్ తో ఉపయోగించాలి.
పిచార పిచ్చుకు కలుపుకుపడే సూచనలు : శీలీంధ్రనాశిని యొక్క కొలిపిన పరిమార్చాన్ని తీసుకొని దానికి కొద్ది మొత్తంలో పిండి జోడించండి. కర్ర లేదా రాచిని ఉపయోగించి బాగా కలిపి, అన్ని వివిధాల పిండి జోడించి, చివరి స్ట్రీ డ్రావలం పిచ్చిదా బాగా కలపండి.

ఉపయోగించవలసిన పరిరం:**నాన్ల సాఫ్ట్ స్ప్రేయర్ నాజల్ రంం**: హలో కోన్ నాజల్
001, డ్రైవేరించవలసిన సమయం: 48 గంటలు
కోతక ముందు పీచి ఉంచవలసిన సమయం: పైపచ్చికలో పేర్చొప్పు నిధంగా
పిచార చేయవలసిన సమయం: అజోక్సిస్ట్రోబిన్ 120 గ్రా/లి + టెబుకొనాజోల్ 240 గ్రా/లి యస్. సి ను తెగులు ముందటి చక్కలో నాన్ల సాఫ్ట్ స్ప్రేయర్ తో ఉపయోగించాలి.

మోతాదు: పై పచ్చికలో పేర్చొప్పు నిధంగా
--

తరచుగా ఉపయోగించవలసిన స్ప్రేసంక్త (గరిష్ట స్ప్రే సంతృప్తీ కలిపి) : మూడు ముందు జ్యోత్రులు: పిచార చేసే సమయంలో తగిన జ్యానేజ్ పరిరంతులు ధరించండి. తగిన ష్టణ దుస్తులు మరియు పాచీయని నిరోధక బూట్లు ధరించండి. తగిన వేరి రోడును ధరించండి. కిమిశ గూనిచ్చి లేదా ప్లీస్ డ్రీడ్ ధరించండి. పిచార చేసేప్పుడు పాగాను నడువలం, అచారం తిడుద లేదా పాగ డ్రాగించ చేయవచ్చు. సర్వాపరణాన్ని కలుపుతం చేయవచ్చు లేదా సర్వాపరంంలోకి వచ్చాలను నిడుదం చేయవచ్చు.
పిప జక్తరాలు: నేటి ద్వారా తీసుకుంటే అపాక్షియా, పిచ్చిపచ్చులుంటే అలసోప, అలసని, జ్యానోరేదము, అలసారం, కడుపు పిచ్చి, ముక్కు నుంచి కారం , పూతో యాక్షిపిట్, పలుకు, పరిసోపదం, పొత్తికడుపు జ్యాన, రోముములు పిచ్చిలో ఉనుకోవచ్చు, ముక్కు, పిచార పాంతులు మరియు దీగులా కనుపడటం.
జ్వరము పిచ్చిపి: పిచ్చిపచ్చులుంటే: దాచిపడిన రాతా గాలికి వలంంది. దాచిపడిని పిచ్చిగా మరియు పిచారలిగా ఉంటుంది. జ్యాన తీసుకోవడం వచ్చుగా ఉంటే, అక్షిప్త ఇచ్చుడి, పైర్ల సంంక్షణ పొందుంది.

వివిధ పచ్చిలుంటే: పాంతుల చేర్చవచ్చు. పుచ్చుంగా నీటిలో నోరు కడుగా. గు్లు పిళ్ళ ఇచ్చి ముందు నోరు కడుక్కోండి. అపాక్షిపక్ ప్లీటిలో ఉన్న పచ్చికి పిచ్చుదూ నోటి ద్వారా పీచు ఇచ్చుట. జ్యాన తీసుకోవడం వచ్చుగా ఉంటే, పైర్ల మరియు పొందండి అక్షిప్త ఇచ్చుడి.
పచ్చాపిడి తగిలిడి : ప్రధానితచ్చెన దుస్తులు తీసేసే, పచ్చు మరియు పిండిలో అన్ని అపాక్షిపక్ పచ్చి పోరాచ్చి కడుగా. అలసారం పచ్చిని పిండితో కుర్లం చేసుకోండి. పిచ్చి పాక్షియాను పండుపుంలో పైర్లపిండి సంధించండి.
కంటికి తగిలిడి: నొప్పి కొనుగోనీ పిచ్చుంగా పిండితో కుర్లం చేసుకోండి, కంటి పిచ్చుగాపిండి సంధించండి.
పిచ్చి హాక్షిపిట్: నిర్లీతించిన మోతాదులో ఉపయోగిస్తే ముక్కును పిచ్చుారితం అవుదు.
విరుగుడు : పిచ్చిపచ్చెన విరుగుడు లేదు. ష్టరాలును బచ్చి చికిత్సను అందించండి.

నిచ్చి పచ్చితులు : 1) ఈ శీలీంధ్రనాశినిని పాక్షిపిండి కాచి యొక్క రోపింతి పాక్షిపిచ్చిలో పుంచి, ఇతర సర్వార్లు నిచ్చి చేసే గదులు లేదా అలసారలో గాకుండా పేదగా చేసి యొక్క పరిమార్లు మరియు పైర్లపిచ్చి బచ్చి చేసు చేసు అలసారంలో పిచ్చి జాంతు పీచి పిచ్చిపూరి. 2) పిచ్చి నిచ్చి చేసే గదులు లేదా అలసరలు పిచ్చి కచ్చిపచ్చి, పాంతుగా, పాచిగా, మంచి గాలి విరుగుడు ధునించేదా పుంతులి. రిచార్లా పీచి అలసి పుంతుల మరియు కలుపుకల కాకుండా కాచిచి ఉపయ్యి పారచుతు.

జాలో ఉచ్చులును పోరవేయ విధానము : 1) పీచి తయారీచారలు మరియు సూత్రీకరణను తయారు చేయవారు మరియు పాచీచారు ఈ జాలో ఉచ్చులును, పిచ్చిలిపోయు మరియు పుంతులు కడుగా పచ్చిని పీచి కలప మరియు లేదా పీచి మరియు కలుపుకల కాకుండా కడు జాల్చిని పేరన్నా పోరవేసికి ఛాచ్చెన పీచికి కంటి. 2) జాలో ఉచ్చులును తిరిగి పిచ్చింగాను పడదాడు నడు పాచీచా అయు పరిశీయదాడు. 3) జాలో ఉచ్చులును పంతుకొప్పి ముక్కును పాచారాచికి దురంగా పోలిపచ్చి.

చిహ్నమున పిచ్చులుం:	
అజోక్సిస్ట్రోబిన్ (ఎ. ఐ)	120.0 గ్రా/లి
టెబుకొనాజోల్ (ఎ. ఐ)	240.0 గ్రా/లి
పెన్సిల్వేనియం అల్యూమినియం సిలికేట్	5.0 గ్రా/లి
పాలి అల్యూరీనేటెడ్ బ్యూటెల్ అథర్	25.0 గ్రా/లి
మెత్తల్ సుతాక్షిరేటెడ్ గ్లాస్ కోపాలిమర్	25.0 గ్రా/లి
డైమెత్తల్ పాలిసిలికేట్స్	5.0 గ్రా/లి
1-2- లింజిథియాజోల్-3- ఒన్	1.0 గ్రా/లి
ప్రాప్లీన్ గ్లైకల్	70.0 గ్రా/లి
జాంతాన్ గను	2.0 గ్రా/లి
పిచు	కావసరమంత గ్రా/లి
మొత్తం	: 1000.00 గ్రా/లి

హెచ్చరిక : ఈ ఉత్పాదనను పక్షులకు, చేపలకు మరియు ఇతర జలచరాులకు వివచారి కనుక, ఈ ఉత్పాదనను పిటి పనురులకు దగ్గరగా ఉపయోగించవద్దు.
నిఛారచుచేయబడిన పంటల పై కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించరాదు.

తయారీ మరియు హార్వెట్ చేయువారు : ఎస్.ఎ.సి.ఎల్. ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్
ఫ్లాట్ నం. 12-ఎ, సి బ్లాక్, లక్ష్మీటౌవర్స్, నాగార్జున హిల్స్, పంజాగుట్ట, హైదరాబా్-500 082, తెలంగాణ, భారతదేశం, ఛార్జింగ్: ఈజెక్టు-533 238, టి.గో. జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్.

Marathi

ऑस्कर

अझोक्सीस्ट्रोबिन १२० ग्रॅम/लि. + टेबुकोनाझोल २४० ग्रॅम/लि. एस.सी (अन्तर्प्रवाही बुुरशीनाशक) (कृषी वापरसाठी)

अझोक्सीस्ट्रोबिन १२० ग्रॅम/लि. + टेबुकोनाझोल २४० ग्रॅम/लि. एस.सी हे एक कूच आणि हान्यर्बक (कोलेटोट्रायमकॅपेसी) आणि मिस्लीवीरिन पावडर बुुरशी (लेविल्युलाटीफिका) आणि क्लस्टर (पायरीक्युकेरिया ओरिझोव्हीई) आणि रिसोलाव्हिडिया (रयारीकोकारीव्हीई) यांच्या मिश्रंजणसाठी एक राखेस्त्रिबल कॉन्सन्ट्रेट बुुरशीनाशक आहे.

पिक(के)	रोगांचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर			अंतिम फवारणी ते कापणी दरम्यान प्रतीक्षा कालावधी (विवर)
		स. त. (ग्रॅम)	मिश्रण (मि.सी.)	पाण्यात घ्रावण (लि.)	
भात	करवा, शीथ क्वाईट	२४९	८३०	९००	२४ दिवस
मिर्ची	फळ कूच, हान्यर्बक, मूखव्या	२४९	८३०	९००	७ दिवस

वापरण्यासाठी निर्देश:
बुुरशीनाशकाचे मोजलेले प्रमाण घ्या आणि त्यात थोडेसे पाणी घाला. काठी किंवा रॉड वापरून नीट ढवळून घ्या आणि नंतर उरलेले पाणी घाला. फवारणीच्या अंतिम द्रावणापर्यंत नीट ढवळून घ्या.

हवामान स्थिती: (सर्वसाधारण):
जेव्हा हवामानाची परिस्थिती उपचारित द्रव्यापासून दूर जाण्यास अनुकूल असेल तेव्हा वापरू नका.

माती आणि पाणी:
उपलब्ध नाही

फवारणीसाठी पिकाची अवस्था:
ऑक्सीस्ट्रोबिन १२० ग्रॅम/लि. + टेबुकोनाझोल २४० ग्रॅम/लि. एस.सी हे रोगाच्या आरंभिक अवस्थेत तोंपरांक रयेयरछात्रे फवारले जाते.

वापरण्याचे तंत्र:
बुुरशीनाशकाचे मोजलेले प्रमाण घ्या आणि त्यात थोडेसे पाणी घाला. काठी किंवा रॉड वापरून नीट ढवळून घ्या आणि नंतर उरलेले पाणी घाला. फवारणीच्या अंतिम द्रावणापर्यंत नीट ढवळून घ्या.

उपकल्पाचा प्रकार:
कॉन्सेशन रयेअर

नोझलचा प्रकार:
हॉली कोन नोझल

मात्रा:
वरील कोटकात उल्लेख केल्यानुसार

मिसकल्पासाठी सूचना:
बुुरशीनाशकाचे मोजलेले प्रमाण घ्या आणि त्यात थोडेसे पाणी घाला. काठी किंवा रॉड वापरून नीट ढवळून घ्या आणि नंतर उरलेले पाणी घाला. फवारणीच्या अंतिम द्रावणापर्यंत नीट ढवळून घ्या.

पुन्हा प्रवेश कालावधी:
४८ तास

