

**Topramezone 336 g/l (w/v) SC
Herbicide**

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (liters)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gms)	Formulation (mL)			
Maize	Elusine indica, Digitaria sanguinalis, Dactyloctenium aegyptium, Echinochloa spp Chloris barbata Parthenium hysterophorus, Digera arvensis, Amaranthus viridis, Physalis minima, Alternanthera sessilis, Convolvulus arvensis, Celotia argentea	25.2 to 33.6g a.i/ha +MSO adjuvant @ 2ml/l of water	75 to 100ml +MSO adjuvant @2 ml/l of water	375	83	—

Topramezone (a I)	336% g/L
1,2-propylene glycol (Adjuvant)	70.00% g/L
Adduct of ethylene oxide to polypropylene glycol (Adjuvant)	30.00% g/L
Sodium salt of a condensation product of phenol sulfonet, urea, phenol and formaldehyde	20.00% g/L
Poly dimethyl siloxane in aqueous emulsion (Adjuvant)	5.00% g/L
Polysaccharide (Adjuvant)	3.00% g/L
1,2-benzisothiazolin-3-one plus 2-methyl-4- isothiazolin-3-one	2.00% g/L
Water	QS % g/L
Total	100.00% w/w

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अभिन ठिठकन का समय हाउरे के बीच अन्तराल (दिन)	पुनः प्रयोग की अवधि ठिठकाव के बाद (घंटे)
		स.तत्व (ग्राम)	संरचना (मि. ली.)			
मकई	इन्साइन हडिका (तुनाहरी घरा) डोङ्किजिया सेनुगेलिस (बियारी) डकार्टोलिकिम एस्वीरोसिएम (मकड़ा) एथेनोगेलोसी एस्, रूवा पाण्डिया गुम्बरफोरस (ताड़-पारा) छान्ना अध्वनी (कुजुर) अम्यरेस विरिडीस (तोताई) कोलेस बाब्डा (फिंगर घरा) मिशालिस मिनीमा (रसपी) अन्दरनपेटे संसेरिस (येया कटी) बायेंकोमुस अभिनी (हेमचुड़ी) सेवेरिया अनेलोस (सामन कुँ)	25.2 to 33.6g a.i./ha +MSO +adjutant @ 2ml/l of water	75 to 100ml +MSO +adjutant @2 ml/l of water	375	83	-

टोपराभिजोन (सत)	336 % ग्रा / ली
1,2 - प्रोपिलिन ग्लाइकोल	70.00 % ग्रा / ली
एडक्ट ऑफ इथाइलिन ओक्टाइड से पोलिप्रोपिलिन ग्लाइकोल	30.00 % ग्रा / ली
फिनोलसल्फोनेट, युरीआ, फिनोल और फोरमालडीहाईड के संक्षेपित उत्पाद का सोडीयम सल्ट	20.00 % ग्रा / ली
जल युक्त इमल्शन में पोलिडाईमिथाइल सिलोक्सेन पोलिसैकराइड	5.00 % ग्रा / ली
1,2 - बेन्जीसोथिआजोलिन-3-वन प्लस 2-मिथाईल-4-आइसोथिआजोलिन-3-वन	3.00 % ग्रा / ली
पानी	2.00 % ग्रा / ली
कुल	पयाप्त मात्रा 100.00 % ग्रा / ली

[illegible]

टोपमैडोलिन स.त.	३३.६० % ब्रॅम/लि.
१, २- पॉलिएथिलीन नलायक (सहायक)	७०.०० % ब्रॅम/लि.
पॉलीप्रोपीलीन नलायक/मॉलथेम् इथिलीन ऑक्साईडचे रमयायोजन (सहायक)	३०.०० % ब्रॅम/लि.
फिनाल सल्फोनेट, युरिया, फिनाल आणि फॉर्मिल्हाइडच्या संक्षेपण	
उत्पन्नाचे सोडियम मीठ	२०.०० % ब्रॅम/लि.
पॉली डायमिथाइल सिलोबरोन जलीय इमल्शनमधे (सहायक)	७.०० % ब्रॅम/लि.
पॉलीसक्टाइड (सहायक)	३.०० % ब्रॅम/लि.
१, २- बॅडिसोथियाइलीन- ३- वन वनर २- मिथाइल- ४-	
आयसोथियाइलीन- ३- वन	२.०० % ब्रॅम/लि.
पाणी	बक्यूस. स. % ब्रॅम/लि.

પાક/કે	કીટકનું સામાન્ય નામ	ડોઝ/કે		પાણીમાં પાતળું કરવું (લિટર)	કેસ કેસબી લણાણી વચ્ચેના પ્રતિવાગો (લિટરમાં)	ટૅક વપરાશ બાદ પુનઃપ્રવેશ (કલામ)
		એ.આઈ. (ગ્રામ)	સંપોજન (મિલી)			
મકાઈ	ઇલ્ડુમાઈલ ઘઉંડિકા, ફિફ્ટેરિયા ટેલેન્ટ્યોસિસ, હેક્ટીટોફ્ટેનિસએપિપ્ટમ, ફિકોક્ટોસા એસપીપી ક્ટોરિસ બાનાઈ પાર્થેનિયમ ફિફ્ટેરોસેસ, ફિપ્ટારિયા એસપીપી અમ્નેન્ટસ વિરિડેસ, ક્લેસેડિસ મિનિંગ, અલ્ટરનેટીયોસેસિલિસ, કોન્યોલ્પુસ અર્બોરિસ, કોનોસિયા આર્બોરિસ	25.2 to 33.6g a.i./ha +MSO adjuvant @ 2ml/l of water	75 to 100ml +MSO adjuvant @2 ml/l of water	375	83	-



Keep in cool,
dry place away
from heat and
open flame.



Warranty: The Recommendation made in this literature are offered in good faith based on the results of officially approved private tests. However, no responsibility will be accepted by us for any injury or damage arising from the use of our product as we cannot exercise any control over storage, handling or application.

32,

m



**SHAKE WELL
BEFORE USE**

নির্মিত ও বাজারকৃত এর দ্বারা : এনএসএল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
প্লট নং ১২-এ, "সি"-ব্লক, লক্ষী টাওয়ার্স, নাগার্জুন হিলস, গুণ্ডাচট্টা, হায়দরাবাদ-৫০০ ০৮২, তেলঙ্গানা, ভারত
কারখানা|| ডাঃ, নং: ৪-২০৮, ইংলকোট-৫৩৩২৩৮, ড. বি. আর. আম্বদেকর ক। ল্যাম্বা মি। জেলা, এ.পি.