15” x 10”

# টীকা

## চাইজফেমিড ৩৪.৫% এছ চি

### (ডেঁকুনাশক)

**পৰিচয়** - চাইজফেমিড ৪৪.৫% এছ চি হিচেছে আলু আৰু টমেটোৰ লেট ব্লাইট আৰু আঙুৰৰ ডাউনি মাইল্ডু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এটা সংশ্লেষ ডেঁকুনাশক।

**ব্যৱহাৰৰ পৰিমাণ:**

| শস্য সমূহৰ নাম | কীট-পতঙ্গৰ নাম | প্ৰতি হেক্টৰৰ মাত্ৰা মাত্ৰা (গ্ৰা.) | মাত্ৰা (মি.লি.) | মিশ্ৰণৰ বাবে পানী (লিটাৰ) | শেষ প্ৰয়োগৰ পৰা চপোৱাটোৰ হব লগা সময় (দিন) |
|---|---|---|---|---|---|
| আলু | ডাউনি মিল্ডিউ | 80 | 200 | 500 | 7 |
| আলু | লেট ব্লাইট | 80 | 200 | 500 | 27 |
| টমেটো | লেট ব্লাইট | 80 | 200 | 500 | 3-5 |

**ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশনা:**

প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণৰ মাত্ৰাটো জুখি কম পৰিমাণৰ পানীত টোকৰ হালদৰে মিহলাই লওক। উপযুক্ত স্প্ৰেয়াৰলৈ শস্যৰ সম্পূৰ্ণ আবৰণৰ বাবে আৱশ্যকীয় চাৰিবাহে নিশ্চিত কৰা অনুসৰি বাকী পৰিমাণৰ পানী যোগ কৰক। প্ৰয়োগৰ হকা আৰু সময়: ৰোগৰ লক্ষণ দেখা দিয়া পিছত স্প্ৰে কৰা।

**মাত্ৰা** - প্ৰপৰৰ তালিকাত উল্লেখ কৰা অনুসৰি।

**মিশ্ৰণৰ বাবে নিৰ্দেশনা:** পথাৰৰ এলেকাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণৰ চাইজফেমিড ৪৪.৫% এছ চি পানীৰ আগতনত হালদৰে মিহলাই লওক।

**ব্যৱহৰ অন্তৰা** - পৰিস্কাৰ আকাশৰ সময়ত প্ৰয়োগ কৰক আৰু বাতৰিৰ সময়ত প্ৰয়োগ নকৰিব।

**পুনৰ প্ৰয়োগৰ সময়সীমা** - ২৪ ঘণ্টা।

**চপোৱাৰ পূৰ্বে** - আঙুৰ: ৭ দিন, আলু: ২৭ দিন, টমেটো: ৩-৫ দিন (তালিকাত উল্লেখ কৰা অনুসৰি)

**প্ৰয়োগৰ সময়** - বাৰিপৰ্যুত বা বৃষ্টিৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰাটো ভাল।

সৰ্বাধিক সফাৰ স্প্ৰেয়াৰ ব্যৱি কম্পাছ - বেগৰ ইঁজাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ২-৩ লী স্প্ৰে কৰা।

**উচিৎতা** - ব্যৱসায় কৃষি ব্যৱহাৰৰ বাবে।

**ফাইটোটক্সিচিটি** - ক্ষেত্ৰৰ পৰাৰ্থৰ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰয়োজনীয় ফাইটোটক্সিক নহয়। প্ৰয়োগৰ বাবে শস্যৰ পৰাগ পৰাগ: উদ্ভিদৰ পৰা প্ৰয়োগ পৰাগিবা।

**সংক্ৰমিত প্ৰকাৰ** - প্ৰপাংকক স্প্ৰেয়াৰ, কম্পছাঁৰ প্ৰপাংকক স্প্ৰেয়াৰ আৰু কম্পছাঁৰ নেপাংকক বেটাৰী স্প্ৰেয়াৰ।

**নোজল ৰকম** - হোলোকোন।

**ব্যৱহাৰকাৰী দ্বাৰা সাৱধানতা** -

১) স্প্ৰে কৰা মানুহজনে উপযুক্ত সুৰক্ষামূলক কাপোৰ যেনে টুপী, দীঘল হাতৰ চাৰ্ট, দীঘল পেন্ট আৰু জোতা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ২) কনচেন্ট্ৰেটছে স্প্ৰে ইনটিঙ্গ চ্ছালিলে চকু আৰু ছালৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। স্প্ৰেয়াৰে কুঁৱলী উশাহ লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। চ্ছালি লোৱাৰ পিছত চাবোনেৰে ছালদৰে ধুব লাগে। প্ৰয়োগৰ সময়ত খাব, পানীয় বা ধূমপান নকৰিব, ৫) দূষিত কাপোৰ আঁতৰাই পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে ধুই পোনাৰ লাগে। খালী পাত্ৰবোৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব। ৪) খালি থোৱাৰ আগতে আৰু কাষৰ পিছত হাত আৰু উন্মুক্ত ছাল চাবোনেৰে ধুব লাগে। ৫) এই ডেঁকুনাশকে স্পে কৰাৰ পিছত স্প্ৰেয়াৰ আৰু বাচন-বৰ্তন ধুবৰ পৰিমাণে চাবোন-পানীৰে ছালদৰে পৰিস্কাৰ কৰিব লাগে।

**বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণ** - প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণসমূহ হবৰ পাবে বমি, বমিৰ সংশ্লিষ্ট, মিহি ধূলি হিচাপে উশাহ লোৱাৰ সময়ত প্ৰাকৃতিক চিঙৰ আৰু হাইপোক্সিৰ কথা হহয় বিৰক্তিকৰ হহব পাৰে।

**প্ৰাথমিক চিকিৎসা** - বেগীক শুচ বতাহলৈ নৈ যাব লাগে। দূষিত ছাল প্ৰচুৰ পৰিমাণে চাবোন-পানীৰে ধুব লাগে। দূষিত পোষাক আঁতৰাই পোনাৰ লাগে। চকু ধুই দূষিত হহয়ে কমেও ১৫ মিনিটৰ বাবে চকু হালদৰে পানীৰে ধুই চিকিৎসকৰ ওলবলৈ যাব লাগে। খাদ্য বিষাক্ত হহয়ে মুখৰ পানীৰে ধুই ১ বা ২ গিলাচ পানী খাব লাগে। অচেতন মানুহক কেচিযাও মুখেৰে একো নিদিব। জননীকীকৰণ অন্তৰ্ভুক্ত বেগীক ওলবৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাওক।

**এন্টিডোট** - কোনো নিৰ্দিষ্ট কথা জনা নাযায়। লক্ষণ অনুসৰি চিকিৎসা কৰক।

**সতৰ্কবাণী** - চেলেঞ্জ আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ চাৰ্ত্তুইব কৰা শস্য কীট-পতংগৰ বাহিৰে আন শস্য আৰু কীট-পতংগৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ নকৰিব। সিকলোচিত দিয়া নিৰ্দেশনা অনুসৰি ব্যৱহাৰৰ পিছত পাত্ৰটো কাটা কৰি পোনাৰ লাগে।

**ব্যৱহৃত পাত্ৰ নিস্তাৰণ** - ১. পলিথেন বা পানী ভৰুলা বোৰ কবিব পৰাটিৰ পোকেট বা উদ্ভৃত সামগ্ৰী নিকাশন আৰু ধুই পুনৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে পৰিচালকসকলে কৰ্তব্য হ'ব। ২) ব্যৱহৃত টোপোলাংবোৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাত বাধা দিবলৈ বাহিৰত এৰি দিব নালাগে। ৩) টোপোলাংবোৰ ভাঙি বাসস্থানৰ পৰা আঁতৰাই পুতি দিব লাগিব।

**সংৰক্ষণ** - ১) ডেঁকুনাশকযুক্ত পেকেটবোৰ পৃথক কোঠা বা টোকৰত, অন্যান্য সামগ্ৰী সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা কোঠা বা টোকৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগিব বা তলা আৰু চাবিৰ তলত পৃথক ৰাখিবাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ২) ডেঁকুনাশকক হকা কাষৰ বাবে নিৰ্মাইত কোঠা বা টোকৰ হালদৰে নিৰ্মিত, শুকাব, ছালদৰে পোহবাই ৰখা আৰু বায়ু চলাচল কৰা আৰু পৰ্যাপ্ত মাত্ৰাৰ হহব লাগিব।

**ৰাসায়নিক গঠন:**

| | |
|---|---|
| ১,২-বেনজিছ থাইয়াজলিন-৪-ৰাল ৰাযাইড - | ০.০৮% ৱ/ৱ |
| চাইজজফেমিড সক্ৰিয় উপাদান - | ৩৪.৫০% ৱ/ৱ |
| হাইড্ৰেটেড মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম চিলিকেট খনিজ বিক্ষিপ্তকৰণ এজেণ্ট - | ০.২৬% ৱ/ৱ |
| পলিডিয়াম ইথথক্সিলেটেড পলিষ্টাইৰোফিনলি ফস্ফেটেট বিক্ষিপ্তকাৰী এজেণ্ট - | ২.১৬% ৱ/ৱ |
| প্ৰপাৰ্জিন ষ্ট্ৰাইকন এন্টি-ফ্ৰীজ এজেণ্ট - | ৮.৬০% ৱ/ৱ |
| ডিচিলন ডিচিক ডিফ'মাৰ্ - | ৫.৯০% ৱ/ৱ |
| পানীত ইমালচনাৰ ডিফ'মাৰ - | ২.৫৯% ৱ/ৱ |
| ইডিয়াম মিথলিন পলিইথাইলন নেফথাইল ছালফনেট হাইড্ৰেক্সাইড - | ২.১৬% ৱ/ৱ |
| পানী পাতলকাৰী - | কু.এস.% ৱ/ৱ |
| জেনথান গাম ঘনকাৰী - | ০.১২% ৱ/ৱ |
| মুঠ - | ১০০.০০% ৱ/ৱ |

**ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লব সতৰ্কতা** - ব্যৱহাৰ পূৰ্ব সংলগ্ন লীফলেটে পঢ়ক।

**ASSAMI**

# ટીકા

## સાયઝોફામિડ ૩૪.૫% એસ.સી.

### (ફુગનાશકનો)

**પરિચય** - સાયઝોફામિડ ૩૪.૫% એસ.સી. એ ફુગનાશક છે જેનો ઉપયોગ બટાકા અને ટામેટા અને દ્રાક્ષના ડાઉની માઇલ્ડ્યુના લેટ બ્લાઇટ ફુગના નિયંત્રણ માટે થાય છે.

**ભલામણ :**

| પાક | રોગનું સામાન્ય નામ | માત્રા પ્રતિ હેક્ટર એ.આઈ (ગ્રા.) | મિશ્રણ (મિ.લી.) | પાણીમાં સાંદ્રતા (લી) | પ્રતીક્ષા સમય (PHI) (દિવસો) |
|---|---|---|---|---|---|
| દ્રાક્ષ | ડાઉની મિલ્ડ્યુ | ૮૦ | ૨૦૦ | ૫૦૦ | ૭ |
| બટાટા | લેટ બ્લાઇટ | ૮૦ | ૨૦૦ | ૫૦૦ | ૨૭ |
| ટામેટા | લેટ બ્લાઇટ | ૮૦ | ૨૦૦ | ૫૦૦ | ૩-૫ |

**ઉપયોગની દિશા:**

ઉત્પાદનમાં જરૂરી જથ્થાને માપો અને ઓછી માત્રામાં પાણી સાથે સારી રીતે ભળી દો. ઉમેરાત સ્પ્રેયર વડે પાકના કુલ કવરેજ માટે આંદોલન દ્વારા ઉત્તેજિત પાણીની બાકીનો જથ્થો ઉમેરો.

**ઉપયોગ કરવાની રીત અને સમય:** રોગના લક્ષણો દેખાયા પર ફોલિયર સ્પ્રે.

**ડોઝ** - ઉપરના કોષ્ટકમાં જણાવ્યા મુજબ.

**મિશ્રણ માટેના સૂચનો:** સાયઝોફામિડ ૩૪.૫% એસ.સી. ના જરૂરી જથ્થાને ખેતરના વિસ્તારની જરૂરિયાત મુજબ પાણીના જથ્થામાં સારી રીતે ભેળવો.

**હવામાન પરિસ્થિતિઓ** - સ્વચ્છ આકાશ દરમિયાન લાગુ કરો અને પવનની સ્થિતિ દરમિયાન લાગુ કરશો નહીં.

**ફરીથી પ્રવેશનો સમયગાળો** - ૨૪ કલાક.

**લણણી પહેલાનું અંતરાલ** - દ્રાક્ષ: ૭ દિવસ, બટાકા: ૨૭ દિવસ, ટામેટા: ૩-૫ દિવસ (કોષ્ટકમાં જણાવ્યા મુજબ)

**ઉપયોગ કરવાનો સમય** - ઝાકળ અથવા વહેલી સવારે અથવા સાંજના કલાકોમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

**સ્પ્રેની મહત્તમ સંખ્યા સહિત આવર્તન** - રોગની તીવ્રતાના આધારે ૨-૩ સ્પ્રે.

**હેતુ** - માત્ર કૃષિ ઉપયોગ માટે.

**ફાયટોટોક્સીસીટી** - ફ્રીલ્ડ બલામણ મુજબ ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે ઉત્પાદન ફાયટોટોક્સિક નથી. અસજ્ઞ માટે પાકનો તબક્કો: વનસ્પતિવી પ્રજનન અવસ્થા.

**સાધનોનો પ્રકાર** - નેપસેક સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન નેપસેક સ્પ્રેયર અને કમ્પ્રેશન નેપસેક બેટરી સ્પ્રેયર.

**નોઝલનો પ્રકાર** - હોલોકોન.

**વપરાશકર્તા દ્વારા સાવચેતી** -

૧. સ્પ્રે માણસને યોગ્ય રક્ષણાત્મક કપડાં જેવા કે ટોપી, લાંબી બાંયનો શર્ટ, લાંબી પેન્ટ અને શૂઝનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ૨. કોન્સન્ટ્રેટ્સ સ્પ્રે દ્રાવણ હાથાકલાના ઝોકે આગિ ત્વચેના સંપર્ક ટાળ. સ્પ્રે મિસ્ટના ઇનહેલેશન ટાળ. હાતાકળીનંતર સાબણ આપિ પાણીને ચાંગલે ધુવા. અર્ગ કરતાના ક્વાક, પીઉ કિંવા ધૂમપાન કરુ નહા. ૩. દૂષિત કપડે ક્વાદુન ટાવા આપિ સુગ્રાર પાણીવાળ્યૂર્વી ધુવા. રિકામ્યા કંટેનરચા પુનઃ વાપર કસ નહા. ૪. ખેવણાપૂર્વી આણિ કામાનંતર હાત આણિ ઉઘડલેલી ત્વચા સાબણને આણિ પાણ્યાને ધુવા. ૫. યા કુરશીનાશકાચી ફવારણી કેલ્યાનંતર, સ્પ્રેઅર આણિ માંડી મગરૂર સાબણ આણિ પાણ્યાને પૂર્ણપણે સ્વચ્છ કરાવીત.

**વિષબાધાચી લક્ષણે** - સુરુવાતીચી લક્ષણે મલમઝ, ઉલટ્યા યાંચે સંયોજન અસૂ શકતાત. સૂક્ષ્મ ધૂલ મ્હણૂન શ્વાસ ઘેતલ્યાસ બ્રોન્કિયલ ટ્યૂબ આણિ ફુફ્ફુસાચ્યા ઊતીંગ ત્રાસ હોઊ શકતો.

**પ્રથમોપચાર** -

રુગ્णાલા તાજી હવેત કાઢા. દૂષિત त्वचा भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. दूषित कपडे काढा. डोळे दूषित असल्यास, कमीतकमी १५ मिनिटे पाण्याने डोळे स्वच्छ धुवा आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सेवनाने विषबाधा झाल्यास, तोंड आणि पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि 1 किंवा 2 ग्लास पाणी प्या. बेशुद्ध माणसाला तोंडाने काहीही देऊ नका. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाला जवळच्या रुग्णालयात न्या.

**उतारा** - कोणतेही विशिष्ट झाल नाही. लक्षणात्मक उपचार करा.

**सावधगिरीचे विधान** - लेबल आणि पत्रकांवरील सदस्यांयातिरिक्त इतर पिकांवर आणि कीटकांवर वापरले जाऊ नये. पत्रकावरील निर्देशानुसार वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा.

**वापरलेला कंटेनरची विल्हेवाट** - १. पर्यावरण किंवा जल प्रदूषण टाळण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्रीची विल्हेवाट लावणे आणि धुणे सुरक्षितपणे करणे हे उत्पादक, कीटकनाशकांचे सूचना आणि ऑपरेटर यांचे कर्तव्य असेल. २. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये. ३. संकुल तोडून वस्तीपासून दूर पुरले जावे.

**स्टोरेज** - १. बुरशीनाशक असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू टेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्यांत खोल्या किंवा आवारापासून दूर, वेगळ्या खोल्या किंवा आवारात संग्रहित केल्या पाहिजेत किंवा लॉक आणि चाबीच्या खाली वेगळ्या अलमिरामध्ये ठेवले पाहिजेत. २. बुरशीनाशके सावध्यासाठी असलेल्या खोल्या कठिण आवार चांगले बांधलेले, कोरडे, चांगले प्रकाशित आणि हवेशीर आणि पुरेशा आकाराचे असावेत.

**રાસાયણિક રચના:**

| | |
|---|---|
| ૧,૨-બેઝિસોથિયાઝોલિન-૩-એક બાયોસાઇડ - | ૦.૦૮% વ/વ |
| સાયઝોફામીડ સ.ઘ. સક્રિય ઘટક - | ૩૪.૫૦% વ/વ |
| હાયડ્રેટેડ મેગ્નેશિયમ એલ્યુમિનિયમ સિલિકેટ ખનિજ વિખુરણને એજંટ - | ૦.૨૬% વ/વ |
| પોટેશિયમ ઇથોક્સીલેટેડ પોલીસ્ટીરિલફેનોલ ફોસ્ફેટ ડિસ્પર્સિંગ એજંટ - | ૨.૧૬% વ/વ |
| પ્રોપીલીન ગ્લાયકોલ એન્ટી-ફ્રીઝિંગ એજંટ - | ૮.૬૦% વ/વ |
| સિલિકોન આધારિત ડિફોમર, વૉટર ઇમલશન ડિફોમરમાં - | ૨.૫૧% વ/વ |
| સોડિયમ મિથલીન પોલિથિલ નેપ્થાઇલ સલ્ફોનેટ સર્ફેક્ટંટ - | ૨.૧૬% વ/વ |
| પાણી પાતળુ | ક્યુ.એસ. % વ/વ |
| ઝેન્થન ગમ થીકનર - | ૦.૧૨% વ/વ |
| કુલ | ૧૦૦.૦૦% વ/વ |

**ઉપયોગ માટે ભલામણ** : ઉપયોગ થી પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો.

**GUJARATI**

# टीका

## सायझोफॅमिड ३४.५% एस.सी.

### (बुरशीनाशक)

**परिचय** - सायझोफॅमिड ३४.५% एस.सी. हे एक बुरशीनाशक आहे ज्याचा उपयोग बटाटा आणि टोमॅटोच्या उशिरा येणाऱ्या प्रकोप आणि द्राक्षाच्या बुरशीच्या नियंत्रणासाठी केला जातो.

**शिफारस :**

| पीक | रोगाचे सामान्य नाव | स.त. (ग्रॅम) | मात्रा/हेक्टर द्रावण (मि.ली.) | पाण्यामध्ये विद्राव्यता (ली.) | प्रतीक्षा कालावधी (पीएचआय) दिवस |
|---|---|---|---|---|---|
| द्राक्ष | डाउनी मिल्ड्यु | ८० | २०० | ५०० | ७ |
| बटाटा | लेट ब्लाइट | ८० | २०० | ५०० | २७ |
| टोमॅटो | लेट ब्लाइट | ८० | २०० | ५०० | ३-५ |

**वापरण्याची दिशा :**

उत्पादनाची आवश्यक मात्रा मोजा आणि थोड्या प्रमाणात पाण्यात चांगले मिसळा, योग्य फवारणी यंत्राने पिकाच्या एकूण कव्हरेजसाठी आंदोलनाद्वारे निर्दिष्ट केल्यानुसार उर्वरित पाणी घाला.

**अर्ज करण्याची पद्धत आणि वेळ:** रोगाची लक्षणे दिसल्यावर पर्णासंबंधी फवारणी करा.

**डोस** - वरील तक्त्यामध्ये संगितल्याप्रमाणे.

**मिश्रणासाठी सूचना:** आवश्यक प्रमाणात सायझोफॅमिड ३४.५% एस.सी. हे क्षेत्राच्या आवश्यकतेनुसार पाण्याच्या प्रमाणामध्ये पूर्णपणे मिसळा.

**हवामान परिस्थिती** - स्वच्छ आकाशात लागू करा आणि वादळी वातावरणात लागू करू नका.

**पुन्हा प्रवेश कालावधी** - २४ तास.

**काढणीपूर्व अंतर** - द्राक्षे: ७ दिवस, बटाटा: २७ दिवस, टोमॅटो: ३-५ दिवस (टेबलमध्ये सांगितल्याप्रमाणे)

**उपयोगाची वेळ** - शक्यतो सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी वापरावे.

**फवारणीचा कमाल संख्येसह वारंवारता** - रोगाच्या तीव्रतेनुसार २-३ फवारण्या.

उद्देश - फक्त कृषी वापरासाठी.

**फायटोटॉक्सिसिटी** - शेतात शिफारसीनुसार वापरल्यास उत्पादन फायटोटॉक्सिक नसते.

**उपयोगाचे पीक अवस्था:** वनस्पतिजन्य ते पुनरुत्पादक अवस्था.

**उपकरणाचा प्रकार** - नॅपसॅक स्प्रेअर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेअर आणि कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेअर.

**नोजल प्रकार** - पोकळ शंकू.

**वापरकर्त्यांची सावधगिरी** -

१. स्प्रे माणसाने टोपी, लांब बाहीचा शर्ट, लांब पॅंट आणि शूज यांसारखे संरक्षणात्मक कपडे वापरावेत. २. कॉन्सन्ट्रेट्स स्प्रे द्रावण हाताळताना डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. स्प्रे मिस्टचा इनहेलेशन टाळा. हाताळणीनंतर साबण आणि पाण्याने चांगले धुवा. अर्जे करताना खाऊ, पीऊ किंवा धूम्रपान करू नका. ३. दूषित कपडे काढून टाका आणि पुन्हा वापरण्यापूर्वी धुवा. रिकाम्या कंटेनरचा पुन्हा वापर करू नका. ४. जेवणापूर्वी आणि कामानंतर हात आणि उघडलेली त्वचा साबणाने आणि पाण्याने धुवा. ५. या बुरशीनाशकाची फवारणी केल्यानंतर, स्प्रेअर आणि मांडी मगरूर साबण आणि पाण्याने पूर्णपणे स्वच्छ करावीत.

**विषबाधाची लक्षणे** - सुरुवातीची लक्षणे मळमळ, उलट्या यांचे संयोजन असू शकतात. सूक्ष्म धूळ म्हणून श्वास घेतल्यास ब्रोन्कियल ट्यूब आणि फुफ्फुसाच्या ऊतींना त्रास होऊ शकतो.

**प्रथमोपचार** -

रुग्णाला ताजी हवेत काढा. दूषित त्वचा भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. दूषित कपडे काढा. डोळे दूषित असल्यास, कमीतकमी १५ मिनिटे पाण्याने डोळे स्वच्छ धुवा आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सेवनाने विषबाधा झाल्यास, तोंड आणि पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि 1 किंवा 2 ग्लास पाणी प्या. बेशुद्ध माणसाला तोंडाने काहीही देऊ नका. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाला जवळच्या रुग्णालयात न्या.

**उतारा** - कोणतेही विशिष्ट झाल नाही. लक्षणात्मक उपचार करा.

**सावधगिरीचे विधान** - लेबल आणि पत्रकांवरील सदस्यांयातिरिक्त इतर पिकांवर आणि कीटकांवर वापरले जाऊ नये. पत्रकावरील निर्देशानुसार वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा.

**वापरलेला कंटेनरची विल्हेवाट** - १. पर्यावरण किंवा जल प्रदूषण टाळण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्रीची विल्हेवाट लावणे आणि धुणे सुरक्षितपणे करणे हे उत्पादक, कीटकनाशकांचे सूचना आणि ऑपरेटर यांचे कर्तव्य असेल. २. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये. ३. संकुल तोडून वस्तीपासून दूर पुरले जावे.

**स्टोरेज** - १. बुरशीनाशक असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू टेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्यांत खोल्या किंवा आवारापासून दूर, वेगळ्या खोल्या किंवा आवारात संग्रहित केल्या पाहिजेत किंवा लॉक आणि चाबीच्या खाली वेगळ्या अलमिरामध्ये ठेवले पाहिजेत. २. बुरशीनाशके सावध्यासाठी असलेल्या खोल्या कठिण आवार चांगले बांधलेले, कोरडे, चांगले प्रकाशित आणि हवेशीर आणि पुरेशा आकाराचे असावेत.

**रासायनिक रचना:**

| | |
|---|---|
| १,२-बेंझिसोथियाझोलिन-३-एक बायोसाइड - | ०.०८% व/व |
| सायझोफामीड स.घ. सक्रिय घटक - | ३४.५०% व/व |
| हायड्रेटेड मॅग्नेशियम ॲल्युमिनियम सिलिकेट खनिज विखुरणाचे एजंट - | ०.२६% व/व |
| पोटॅशियम इथॉक्सिलेटेड पॉलीस्टीरिलफेनॉल फॉस्फेट डिस्पर्सिंग एजंट - | २.१६% व/व |
| प्रोपीलीन ग्लायकॉल ॲन्टी-फ्रीझिंग एजंट - | ८.६०% व/व |
| सिलिकॉन आधारित डिफोमर, वॉटर इमल्शन डिफोमरमध्ये - | २.५१% व/व |
| सोडियम मिथलीन पॉलिथिल नॅफ्थाइल सल्फोनेट सर्फेक्टंट - | २.१६% व/व |
| पाणी पातळ | क्यु.एस. % व/व |
| झेंथन गम थिकनर - | ०.१२% व/व |
| एकूण - | १००.००% व/व |

**वापरासाठी निर्देश** : वापरापूर्वी संलग्न पत्रिका पहा.

**MARATHI**

# टीका®

## सायझोफॅमिड ३४.५% एस.सी.

### (ઉંસીળગ્રહ)

**નાટ-પ્લાટ** - સાયઝોફેમિડ ૩૪.૫% એસ.સી. દિંગ મેલાન ઉંસીળગમ વૈ સિસરી દ્વારકે અગુ બડે ટામ્ટલે કે પાકેડી ધૂકલ અંકે અંતુલ દે ગૈરેં કહુંલી દે નિર્ગસ્કર સરી સીડી નંચી છે.

**ક્રિયત્રિત :**

| ડાગર | ઝીમની દા આમ નામ | દે.આઈ. (ગ્રા.) | માત્રા/હેક્ટર ઘટ્ટન (મિ.લી.) | પાણી દિંગ પેડલર (લી.) | ઉંસીળ દા સમં અખરી વરડે કે વચ્ચે દિંગ (દિન) |
|---|---|---|---|---|---|
| અંતુલ | ડાઉની મિલ્ડિયુ | ૮૦ | ૨૦૦ | ૫૦૦ | ૭ |
| અગુ | લેટ બ્લાઇટ | ૮૦ | ૨૦૦ | ૫૦૦ | ૨૭ |
| ટામટલ | લેટ બ્લાઇટ | ૮૦ | ૨૦૦ | ૫૦૦ | ૩-૫ |

**વરડે દી તિમ:**

ઉંસળગ દી સેડીલી માત્રા કુ અપે બેડી બેડી માત્રા દિંગ પાણી નગ્ર સંલી ડગુ કરાણે. ઉંસિલ સપ્રેયર નગ્ર ડગલ દી ઝંસ અવયંગ સરી ઍનીટેગલ કુબેંગર નિગવરડ ઝીડે અંતુલગ ઘગી સરી માત્રા દિંગ પાણી ખડે.

**અર્ગ કરુવાચી પદ્ધત આણિ વેળ:** રોગાચી લક્ષણે દિસલ્યાવર પર્ણાસંબંધી ફવારણી કરા.

**ડોસ** - વરીલ તક્યામધ્યે સંગિતલ્યાપ્રમાણે.

**મિશ્રણાસ્તી સૂચના:** આવશ્યક પ્રમાણાત સાયઝોફેમિડ ૩૪.૫% એસ.સી. હે ક્ષેત્રાચ્યા આવશ્યકતેનુસાર પાણ્યાચ્યા પ્રમાણામધ્યે પૂર્ણપણે મિસળા.

**હવામાન પરિસ્થિતી** - સ્વચ્છ આકાશાત લાગુ કરા આણિ વાદળી વાતાવરણાત લાગુ કરુ નકા.

**પુન્હા પ્રવેશ કાલાવધી** - ૨૪ તાસ.

**કાઢણીપૂર્વ અંતર** - દ્રાક્ષે: ૭ દિવસ, બટાટા: ૨૭ દિવસ, ટોમેટો: ૩-૫ દિવસ (ટેબલમધ્યે સાંગિતલ્યાપ્રમાણે)

**ઉપયોગાચી વેળ** - શક્યતો સકાળી લવકર કિંવા સંધ્યાકાળી વાપરાવે.

**ફવારણીચા કમાલ સંખ્યેસહ વારંવારતા** - રોગાચ્યા તીવ્રતેનુસાર ૨-૩ ફવારણ્યા.

ઉદ્દેશ - ફક્ત કૃષી વાપરાસાઠી.

**ફાયટોટોક્સિસિટી** - શેતાત શિફારસીનુસાર વાપરલ્યાસ ઉત્પાદન ફાયટોટોક્સિક નસતે.

**ઉપયોગાચે પીક અવસ્થા:** વનસ્પતિજન્ય તે પુનરુત્પાદક અવસ્થા.

**ઉપકરણાચા પ્રકાર** - નૅપસૅક સ્પ્રેઅર, કૉમ્પ્રેશન નૅપસૅક સ્પ્રેઅર આણિ કૉમ્પ્રેશન નૅપસૅક બૅટરી સ્પ્રેઅર.

**નોજલ પ્રકાર** - પોકળ શંકૂ.

**વાપરકર્ત્યાચી સાવધગિરી** -

૧. સ્પ્રે માણસાને ટોપી, લાંબ બાહીચા શર્ટ, લાંબ પૅંટ આણિ શૂજ યાંસારખે સંરક્ષણાત્મક કપડે વાપરાવેત. ૨. કૉન્સન્ટ્રેટ્સ સ્પ્રે દ્રાવણ હાતાકલાતા ડોળે આણિ ત્વચેચા સંપર્ક ટાળા. સ્પ્રે મિસ્ટચા ઇનહેલેશન ટાળા. હાતાકળીનંતર સાબણ આણિ પાણ્યાને ચાંગલે ધુવા. અર્ગે કરતાના ક્વાક, પીઉ કિંવા ધૂમ્રપાન કરૂ નકા. ૩. દૂષિત કપડે કાઢૂન ટાવા આણિ પુન્હાર વાપરણ્યાપૂર્વી ધુવા. રિકામ્યા કંટેનરચા પુન્હા વાપર કસ નકા. ૪. ખેવણાપૂર્વી આણિ કામાનંતર હાત આણિ ઉઘડલેલી ત્વચા સાબણાને આણિ પાણ્યાને ધુવા. ૫. યા કુરશીનાશકાચી ફવારણી કેલ્યાનંતર, સ્પ્રેઅર આણિ માંડી મગરૂર સાબણ આણિ પાણ્યાને પૂર્ણપણે સ્વચ્છ કરાવીત.

**વિષબાધાચી લક્ષણે** - સુરુવાતીચી લક્ષણે મલમઝ, ઉલટ્યા યાંચે સંયોજન અસૂ શકતાત. સૂક્ષ્મ ધૂલ મ્હણૂન શ્વાસ ઘેતલ્યાસ બ્રોન્કિયલ ટ્યૂબ આણિ ફુફ્ફુસાચ્યા ઊતીંગ ત્રાસ હોઊ શકતો.

**પ્રથમોપચાર** -

રુગ્णાલા તાજી હવેત કાઢા. દૂષિત त्वचा भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. दूषित कपडे काढा. डोळे दूषित असल्यास, कमीतकमी १५ मिनिटे पाण्याने डोळे स्वच्छ धुवा आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सेवनाने विषबाधा झाल्यास, तोंड आणि पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि 1 किंवा 2 ग्लास पाणी प्या. बेशुद्ध माणसाला तोंडाने काहीही देऊ नका. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाला जवळच्या रुग्णालयात न्या.

**उतारा** - कोणतेही विशिष्ट झाल नाही. लक्षणात्मक उपचार करा.

**सावधगिरीचे विधान** - लेबल आणि पत्रकांवरील सदस्यांयातिरिक्त इतर पिकांवर आणि कीटकांवर वापरले जाऊ नये. पत्रकावरील निर्देशानुसार वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा.

**वापरलेला कंटेनरची विल्हेवाट** - १. पर्यावरण किंवा जल प्रदूषण टाळण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्रीची विल्हेवाट लावणे आणि धुणे सुरक्षितपणे करणे हे उत्पादक, कीटकनाशकांचे सूचना आणि ऑपरेटर यांचे कर्तव्य असेल. २. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये. ३. संकुल तोडून वस्तीपासून दूर पुरले जावे.

**स्टोरेज** - १. बुरशीनाशक असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू टेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्यांत खोल्या किंवा आवारापासून दूर, वेगळ्या खोल्या किंवा आवारात संग्रहित केल्या पाहिजेत किंवा लॉक आणि चाबीच्या खाली वेगळ्या अलमिरामध्ये ठेवले पाहिजेत. २. बुरशीनाशके सावध्यासाठी असलेल्या खोल्या कठिण आवार चांगले बांधलेले, कोरडे, चांगले प्रकाशित आणि हवेशीर आणि पुरेशा आकाराचे असावेत.

**રાસાયણિક રચના:**

| | |
|---|---|
| ૧,૨-બેંઝિસોથિયાઝોલિન-૩-દિક બાયોસિગ્નેટ્સ - | ૦.૦૮% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ |
| સિમ્પ્લેક્સાઝોલ ઇ.એ.સી. સક્રિયતા સમ્પ્લેક્સ - | ૩૪.૫૦% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ |
| હાઈડ્રેટેડ મેગ્નેશિયમ એલ્યુમિનિયમ સિલિકેટ ખનિજ વિખેરાઈ એજન્ટ - | ૦.૨૬% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ |
| પોટેશિયમ ઇથોક્સિલેટેડ પોલીસ્ટીરિલફેનોલ ફોસ્ફેટ ડિસ્પર્સિંગ એજન્ટ - | ૨.૧૬% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ |
| પ્રોપીલીન ગ્લાયકોલ ઍન્ટી-ફ્રીઝિંગ એજન્ટ - | ૮.૬૦% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ |
| સિલિકો

# 15” x 10”

## ٹیکہ
### سیازوفامڈ34.5فیصد ایس سی
### (رابطہ فنگسائڈ)

سیازوفامڈ 34.5 ڈبلیو پی ایس سی ایک رابطہ فنگسائڈ ہے جس کا استعمال آلو، ٹماٹر کے پھیپھڑے اور انگوری کے پھپھوندی کے خاتمے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔

**استعمال :**

| فصل | کیڑے کی عام نام | کیڑے کی مقدار (گرام) | پانی کی مقدار (لیٹر) | فی ہیکٹر مقدار (ملی لیٹر) | آخری چھڑکاؤ یا فصل کاٹنے تک وقفہ (دنوں میں) |
|---|---|---|---|---|---|
| انگور | مرر دوملڈیو | 80 | 200 | 500 | 7 |
| | آرچرڈ اسپرے | | | | |
| آلو | پچھیتا انگماری | 80 | 200 | 500 | 27 |
| ٹماٹر | پچھیتا انگماری | 80 | 200 | 500 | 3-5 |

**استعمال کیلئے ہدایت:** پھپھوندی ٹھیک کر پائیں آغاز کرنے سے پہلے تھوڑے سے پانی میں ملا کیں۔ اس کے بعد پانی کی مقدار مقدار کا آدھا رہنے تک ہلاتے رہیں۔ فصل پر اس کی مناسب اسپرے کی مدد سے پوری فصل پر چھڑکا کریں۔

**استعمال کا وقت اور طریقہ :** چھڑکاؤ بیماری کے علامت نظر آنے کے فوراً بعد استعمال کیا جائے۔ اسپرے تین دفعہ استعمال کریں۔

**کیٹ نانٹک کے استعمال کیلئے بہتر تکنالوجی:**

**مقدار :** سیازوفامڈ 34.5 ڈبلیو پی ایس سی کی مناسب مقدار کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ مقررہ مقدار کے مطابق ملائیں۔ مسوم کی موجودگی، اسٹاک آمیان کے وقت استعمال کریں۔ تیز ہوا چلنے کے موقعوں میں استعمال نہ کریں۔

**دوبارہ استعمال کا وقت 24 گھنٹے۔**

**فصل کاٹنے میں فرق فرق:** انگور 7 دن، آلو 27 دن، ٹماٹر 3-5 دن (بیماری کی نوعیت کی بنیاد پر)۔

**استعمال کا وقت:** تمام طور سے پانی کے ساتھ کے وقت

**اسپرے سے زیادہ تعداد:** ایک مقررہ تعداد کے مطابق استعمال کریں۔

**مقصد:** زہر استعمال کیلئے۔

**پلاٹ زہر آلود:** خشک کے مقدار کے مطابق استعمال کرنے پر پھپھوندی کے ساتھ ساتھ کیڑے کے دوران کیٹ نانٹک کی کھل کی پھل پر استعمال نہیں ہوتی ہے کھل کے پک